

Abrea, 75 mg, tabletki dojelitowe, 90 tabletek

Cena: 11,15 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	90 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	KRKA D.D. NOVO MESTO
Przeznaczenie	Przeciwnzakrzepowe, Rozrzedzające krew
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Abrea to lek stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi.

Wskazania

Przyjmowanie leku Abrea może zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i dlatego też zapobiega późniejszym:

- zawałom serca
- udarom mózgu
- chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których występuje stabilna lub niestabilna dławica piersiowa (rodzaj bólu w klatce piersiowej).

Działanie

Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka sytuacja wystąpi w sercu, może to spowodować zawał serca lub dławicę piersiową; a w mózgu może wywołać udar.

Dawkowanie

Dorośli:

- Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego: 75-160 mg raz na dobę.
- Zapobieganie udarowi: 75-325 mg raz na dobę.
- Zapobieganie zaburzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ustabilizowaną lub niestabilną dławicą: 75-160 mg raz na dobę.
- Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych: 75-160 mg raz na dobę.

Skład

- Substancją czynną jest: kwas acetylosalicylowy
- Substancje pomocnicze to: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia ziemniaczana, skład pierwszej otoczki: talk, triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, sodu dodecylsulfonian, polisorbat 80, skład drugiej otoczki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, karmin (E 120), żółcień pomarańczowa, (E 110), lak aluminiowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Abrea:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;
- w przypadku uczulenia na inne salicylany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). NLPZ są często stosowane w leczeniu zapalenia stawów, reumatyzmu lub bólu;
- jeśli po zastosowaniu salicylanów lub NLPZ wystąpił kiedykolwiek u pacjenta napad astmy lub obrzęk niektórych części ciała, np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy);
- jeśli aktualnie lub w przeszłości występował u pacjenta wrzód żołądka lub dwunastnicy, lub jakiegokolwiek rodzaj krwawienia, np. udar;
- jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta zaburzenia krzepnięcia krwi;
- w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek;
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca powodujące duszność i obrzęk kostek;
- jeśli pacjent przyjmuje lek metotreksat (np. w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów) w dawce większej niż 15 mg na tydzień.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- nudności, wymioty, biegunka,
- niestrawność,
- zwiększona skłonność do krwawienia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- pokrzywka,
- katar,
- trudności w oddychaniu.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit,
- skurcze w dolnej części układu oddechowego,
- zapalenie naczyń krwionośnych,
- wybroczyny z fioletowymi plamami,
- nieprawidłowe obfite lub przedłużające się miesiączki.

Działania niepożądane o nieznanym częstości

- dzwonienie w uszach,
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- wrzód żołądka lub dwunastnicy,
- zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia

- Lek Abrea nie jest odpowiedni do stosowania jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy.
- Istnieje zwiększone ryzyko krwotoku i wydłużonego czasu krwawienia, szczególnie podczas lub po zabiegu chirurgicznym,
- Lek Abrea nie jest zalecany podczas obfitego krwawienia miesiączkowego, ponieważ może on nasilać krwawienie.
- Należy stosować ostrożnie w przypadku niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

KRKA
Równoległa 5
Warszawa