

## Acard 150 mg x 60 tabl. dojelit.

Cena: 21,77 zł



### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ACARD
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki dojelitowe
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA
Przeznaczenie	Serce, Układ krążenia
Rodzaj produktu	Lek
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

### Opis produktu

#### Składniki

Acetylsalicylic Acid

#### Stosowanie

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

#### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### Przeciwwskazania

Znaczna część podanych poniżej ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczy kwasu acetylosalicylowego stosowanego w dawkach konwencjonalnych, tj. od 1g do 3g na dobę i wystąpienie tych reakcji jest mało prawdopodobne przy stosowaniu małych dawek produktu. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie: w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, w okresie karmienia piersią, w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, podczas jednoczesnego stosowania ibuprofenu, który może wpływać na działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego, u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek, u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie (dla Acard również u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej). Kwas acetylosalicylowy może być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inne substancje alergizujące wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny z polipami błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów wykazujących reakcje alergiczne (np. odczyn skórny, świąd, pokrzywka) na inne substancje. U pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień (hemofilia, niedobór witaminy K), przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (np. pochodne kumaryny lub heparynę – z wyjątkiem

leczenia heparyną w małych dawkach) zastosowanie kwasu acetylosalicylowego należy rozważyć, uwzględniając stosunek ryzyka do korzyści. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek. Należy rozważyć stosowanie produktu leczniczego u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, ponieważ może się uczynić choroba wrzodowa oraz mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy, ze względu na działanie antyagregacyjne, może powodować wydłużenie czasu krwawienia podczas lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego na 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, zwłaszcza okulistycznym i otologicznym. Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego produkt leczniczy może wywołać napad dny moczanowej. Acard lub Acard 150 mg zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

## Producent

Polfa Warszawa S.A.

## Opis

Acard 150 mg x 60 tabl. dojelit.

## Galeria



**Acard**  
Aspiryna

**LEK**

### DZIAŁANIE

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.

Acard przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

\* Na podstawie: Ulotka dołączona do opakowania ACARD- Informacja dla pacjenta.

**Acard**  
Aspiryna

**LEK**

### WSKAZANIA

- w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
- w świeżym zawałowi serca lub podejrzeniu świeżego zawałowi serca;
- w niestabilnej chorobie wieńcowej;
- w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;
- po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczępieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;

**Acard**  
Aspiryna

**LEK**

### STOSOWANIE



Wystarczy jedna tabletkę na dobę\*

Tabletka dojelitowa posiada otoczkę i nie rozpada się w żołądku, dzięki czemu nie podrażnia błony śluzowej żołądka.

- Przyjmować po posiłku
- Połykać w całości
- Popić niewielką ilością wody

\*Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku ACARD. Lekarz określi dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz okresy czas stosowania.

**Acard**  
Aspiryna

### SPRAWDŹ RÓWNIEŻ



ACARD/892/06-2022