

Acatar Acti Tabs, 60 mg + 2,5 mg, tabletki, 12 tabletek

Cena: 28,01 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Acatar Acti-Tabs to preparat wykorzystywany w leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów alergicznego nieżytu nosa. Zawiera dwie substancje aktywne: pseudoefedrynę i triprolidynę.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku Acatar Acti-Tabs jest łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, wyciek wydzieliny z nosa (katar), uczucie zatkanego nosa oraz kichanie, występujących w przebiegu grypy. Lek może być także stosowany doraźnie w przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i w naczynioruchowym obrzęku błony śluzowej nosa.

Działanie

Acatar Acti - Tabs zawiera dwie substancje czynne. Pseudoefedryna hamuje obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa a także zatok przynosowych, w efekcie udrażniając nos. Triprolidyna ogranicza kichanie i świąd nosa. Lek zmniejsza ilość wydzieliny z nosa (katar).

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 tabletkę co 6-8 godzin.
- Maksymalna dawka dobową wynosi 4 tabletki.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: chlorowodorek pseudoefedryny (Pseudoephedrine hydrochloride) i triprolidyny chlorowodorek (Triprolidine hydrochloride).
- 1 tabletkę zawiera 60 mg pseudoefedryny i 2,5 mg triprolidyny.
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, skrobia żelowana, laktoza, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Acatar Acti-Tabs: jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na aminy sympatykomimetyczne, takie jak efedryna czy fenylefryna stosowane m.in. w celu obkurczenia błony śluzowej nosa; jeśli pacjent stosuje lub w czasie ostatnich 14 dni stosował leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy stosowane niekiedy w leczeniu depresji; u osób z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub niestabilną chorobą niedokrwienną serca; u osób z ciężką niewydolnością wątroby i nerek; w ciąży i w okresie karmienia piersią; jeśli pacjent przyjmuje furazolidon (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych) lub inne leki zawierające pseudoefedrynę lub leki antyhistaminowe; u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia

- Podczas stosowania leku Acatar Acti-Tabs może wystąpić nagły ból brzucha lub krwawienie z odbytu w wyniku stanu zapalnego jelita grubego (niedokrwienne zapalenie jelita grubego). Jeśli wystąpią takie objawy dotyczące przewodu pokarmowego, należy przerwać stosowanie leku Acatar Acti-Tabs i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza lub zgłosić się po pomoc medyczną.
- Jeśli objawy się utrzymują, nasilają lub nie ustąpią po 3 dniach, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek Acatar Acti-Tabs zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław

Galeria

