

# Acatar Care aerozol do nosa roztwór 500mcg/ml 15



Cena: 25,50 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ACATAR
Opakowanie	15 ml (but.)
Postać	Aerozol
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Udrażniające nos, Ułatwiający oddychanie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

## Opis produktu

### Opis

Lek jest przeznaczony do stosowania w obrzęku błon śluzowych występującym w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

### Działanie

Zmniejszające obrzęk błon śluzowych nosa i ułatwiające oddychanie.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu Acatar Care do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę. Nie należy stosować dłużej niż 5 do 7 dni.

### Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancja czynna: 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodoru,
- pozostałe składniki to: glicerol 85%, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu hialuronian, kwas solny 25% (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

### Przeciwwskazania

Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub jeśli pacjent: jest w trakcie leczenia inhibitorami monoaminoooksydazy (inhibitory MAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni oraz leczenie innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi; ma zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania, ma ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych; ma guz chromochłonny nadnerczy, ma zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).



### Działania niepożądane

Często:

- pieczenie, suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.

Niezbyt często:

- kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca i wzrost ciśnienia tętniczego, występujące po miejscowym (donosowym) stosowaniu leku.

### Ostrzeżenia

Należy unikać długotrwałego stosowania i przedawkowania. Skuteczność leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może się zmniejszyć (tachyfilaksja) wskutek ich długotrwałego stosowania lub przedawkowania. Stałe stosowanie leku prowadzi do utrudniającego oddychanie obrzęku spowodowanego reaktywnym przekrwieniem błony śluzowej nosa (efekt odbicia) i przewlekłego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa), a także zaniku błony śluzowej lub suchego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Efekt odbicia i tachyfilaksja powinny ustąpić po przerwaniu stosowania leku. Podobnie nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej i reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa).

### Producent

US PHARMACIA  
Ziębicka 40  
Wrocław