

# Acatar Care Kids aer.donosa 250mcg/ml 15ml

Cena: 27,18 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	ACATAR
Opakowanie	15 ml
Postać	Aerazol
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Katar
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Od 1 roku życia

## Opis produktu

### Opis

**Acatar Care Kids** to lek dostępny w postaci aerozolu do nosa, przeznaczony specjalnie do stosowania u dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat. Skład preparatu obejmuje substancję czynną o nazwie chlorowodorek oksymetazoliny, który działa poprzez zwężanie naczyń krwionośnych. W składzie leku znajduje się również kwas hialuronowy w formie soli sodowej, pełniący funkcję substancji pomocniczej. Ten składnik jednocześnie chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

### Działanie

Po zastosowaniu miejscowym lek obkurcza naczynia krwionośne nosa, przez co zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej.

### Dawkowanie

Dzieci w wieku powyżej 1 roku do 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2-3 razy na dobę.

### Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: oksymetazoliny chlorowodorek 0,25 mg (co odpowiada 11,25 µg substancji czynnej na dawkę, czyli 45 µl),
- pozostałe składniki: glicerol 85%, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu hialuronian, kwas solny 25% (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

### Przeciwwskazania

- Suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).
- Uczulenie na oksymetazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Acatar Care Kids.
- Przebyta operacja wykonywana przez nos, np. usunięcie przysadki lub operacja przebiegająca z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta).
- Nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia.

### Działania niepożądane

- Często: pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.
- Niezbyt często: objawy ogólnoustrojowe, takie jak kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca i wzrost ciśnienia tętniczego, występujące po miejscowym (donosowym) stosowaniu leku.

### Ostrzeżenia

Skuteczność leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może się zmniejszyć (tachyfilaksja) wskutek ich długotrwałego stosowania lub przedawkowania. Może to prowadzić do stosowania coraz większych dawek lub częstszego stosowania leku, co z kolei może skutkować stałym stosowaniem leku. W przypadku długotrwałego stosowania lub nadużywania leku należy natychmiast zaprzestać jego stosowania. Stałe stosowanie leku prowadzić może do utrudniającego oddychanie obrzęku spowodowanego reaktywnym przekrwieniem błony śluzowej nosa (efekt odbicia) i przewlekłego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa), a także zaniku błony śluzowej lub suchego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Efekt odbicia i tachyfilaksja powinny ustąpić po przerwaniu stosowania leku. Podobnie nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej i reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa). Należy unikać stosowania dłuższego niż zalecane oraz przedawkowania leku.

### Producent

US PHARMACIA  
Ziębicka 40  
Wrocław