

Acatar Control 0,5 mg/ ml, aerozol do nosa, 15ml



Cena: 24,52 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ACATAR
Opakowanie	15 ml
Postać	Aerozol
Producent	US PHARMACIA
Przeznaczenie	Katar
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Acatar Control to lek, którego substancją czynną jest oksymetazolina chlorowodorek, który działa na błonę śluzową nosa poprzez zmniejszenie jej obrzęku oraz zahamowanie nadprodukcji wydzieliny związanej z procesem zapalnym. W konsekwencji lek ten prowadzi do udrożnienia nosa, co z kolei usprawnia proces oddychania przez nos oraz redukuje objawy kataru.

Wskazania

Lek Acatar Control jest zalecany w leczeniu obrzęku błon śluzowych, który towarzyszy ostremu zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej oraz zapaleniu ucha środkowego.

Działanie

Działanie Acatar Control polega również na zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej nosa, co prowadzi do rozszerzenia i otwarcia przewodów odprowadzających zatok przynosowych oraz odblokowania trąbek słuchowych. W ten sposób ułatwione zostaje usuwanie wydzieliny, co z kolei przyczynia się do skuteczniejszego wyleczenia zakażenia bakteryjnego. Lek ten działa bardzo szybko - już po kilkunastu sekundach od podania - i utrzymuje swoje działanie przez okres do 12 godzin.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: należy podawać po jednej dawce do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: należy podawać po jednej dawce do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Stosować jedynie przez krótki okres 3 do 5 dni, nie dłużej niż 7 dni. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.



Skład

Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku. Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glikol propylenowy, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Acatar Control jest wystąpienie u pacjenta uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną - oksymetazolinę chlorowodorek - lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Ponadto, lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, oxymetazolina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Często występujące (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek): uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa i kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów.
- Rzadko występujące (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób stosujących lek): kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca i zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym podaniu leku.
- Bardzo rzadko występujące (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek): bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój.

Ostrzeżenia

- Lek Acatar Control zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 1 miesiąc.

Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław