

ACC mini 100 mg, granulat, 20 saszetek



Cena: 16,64 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 saszetek po 3g
Postać	Proszek
Producent	SANDOZ GMBH
Przeznaczenie	Wspierające, Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Proszek ACC mini, stosowany do sporządzania roztworu doustnego, zawiera substancję czynną acetylocysteinę, która skutecznie redukuje lepkość wydzieliny oskrzelowej, wspomagając proces odkrztuszania.

Wskazania

ACC mini stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat:

- Dawka dobową acetylocysteinę wynosi od 400 mg
- do 600 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych

(2 saszetki ACC mini dwa lub trzy razy na dobę).

Dzieci w wieku od 7 do 14 lat:

- Dawka dobową acetylocysteinę wynosi 400 mg w 2 lub 4 dawkach podzielonych (1 saszetka

ACC mini cztery razy na dobę lub 2 saszetki ACC mini dwa razy na dobę).

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat:

- Dawka dobową wynosi od 200 mg do 300 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (1 saszetka ACC mini

dwa lub trzy razy na dobę).



Skład

- 3 g proszku (1 saszetka) zawierają 100 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).
- Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
- 3 g proszku (1 saszetka) zawierają 2,829 g sacharozy.

Stosowanie

Dzieci w wieku od 7 do 14 lat

- Zawartość 1 saszetki ACC mini cztery razy na dobę lub zawartość dwóch saszetek ACC mini dwa razy na dobę (co odpowiada 400 mg acetylocysteiny na dobę w 2 lub 4 dawkach podzielonych).

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat

- 1 saszetka ACC mini dwa lub trzy razy na dobę (200 mg do 300 mg acetylocysteiny na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych).

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
- Ostry stan astmatyczny.
- Nietolerancja fruktozy.
- Zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny.
- Ciąża i okres karmienia piersią.

Producent

Sandoz GmbH