

Acesan 30 mg, 63 tabletek

Cena: 14,96 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	63 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	SUN-FARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Choroba niedokrwienna serca
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Acesan 30 mg to produkt leczniczy w postaci tabletek, zawierający skład acetylosalicylowego. Opakowanie wykonane z tektury zawiera 63 żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o jednolitej powierzchni, umieszczone w aluminiowych blistrach. Kwas acetylosalicylowy obniżający zdolność krwi do agregacji (czyli zlepiania się) i formowania zakrzepów. Jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), który działa poprzez hamowanie działania enzymu cyklooksigenazy (COX), niezbędnego do wytwarzania tromboksanu A2 (TXA2), kluczowego czynnika powodującego zlepianie się krwi.

Wskazania

Lek Acesan 30 mg stosuje się:

- w zapobieganiu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
- w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po interwencjach na naczyniach (pomostowanie aortalno-wieńcowe),
- w zapobieganiu udarowi mózgu,
- w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po świeżym zawale serca,
- w dławicy piersiowej.

Działanie

Tabletki Acesan hamują zdolność płytek krwi do agregacji i tworzenia zakrzepów.

Dawkowanie

Stosuje się 1 tabletkę raz na dobę.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: 30 mg kwasu acetylosalicylowego,
- substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwas stearynowy, żółcień

chinolowa, lak (E104).

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne związki salicylowe lub dodatkowe składniki.
- Skazy krwotocznej.
- Aktywna choroba wrzodowej przewlekłej i/lub dwunastnicy.
- Ciężkiej choroby układu krążenia, serca lub serca.
- Przebytych napadów astmy oskrzelowych wywołanych podawaniem salicylanów lub rozwiązania o przybliżonym działaniu, w niesteroidowych właściwościach przeciwzapalnych.
- Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawce 15 mg na tydzień lub administracyjne.
- Trzeciego trymestru ciąży.

Działania niepożądane

- zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania),
- wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd,
- zaburzenia serca,
- zaburzenia układu oddechowego (w tym astma),
- objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty),
- bóle brzucha.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ostrzeżenia

- Leku Acesan nie należy stosować jako środka przeciwbólowego ani przeciwgorączkowego.
- Kwas acetylosalicylowy może spowodować skurcz oskrzeli i wywołać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na takie reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarzem siennym z polipami błony śluzowej nosa oraz pacjenci, u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd lub pokrzywka).
- Nie należy stosować leku Acard przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznych (również przed niewielkimi zabiegami np. usunięcie zęba),

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.