

Acetylcysteinum Flegamina, 600 mg, tabletki musujące, 10 tabletek

Cena: 18,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki musujące
Producent	TEVA B.V.
Przeznaczenie	Mukolityczne, Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Acetylcysteinum Flegamina to lek o działaniu mukolitycznym, który rozrzedza śluz i wspomaga odkrztuszanie zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych. Dostępny w formie tabletek musujących, przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 14. roku życia.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania leku Acetylcysteinum Flegamina jest rozrzedzenie uporczywej wydzieliny z dróg oddechowych przy utrudnionym jej transporcie oraz w zapaleniu oskrzeli spowodowanym przeziębieniem.

Działanie

Lek zawiera acetylocysteinę, która działa mukolitycznie, czyli rozrzedza uporczywy śluz w drogach oddechowych, ułatwiając w ten sposób jego odkrztuszanie i transport.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 1 tabletka musująca raz na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest acetylocysteina (Acetylcysteinum).
- Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas adypinowy, powidon K-25, aspartam (E 951), aromat cytrynowy (zawiera maltodekstrynę, sacharozę, gumę arabską (E 414), triacetynę (E 1518), alfa-tokoferol (E 307)).

Przeciwwskazania

Tabletek musujących Acetylcysteinum Flegamina nie należy stosować u osób nadwrażliwych na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): reakcje nadwrażliwości, ból głowy, dzwonienie w uszach, przyspieszone bicie serca, wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej w jamie ustnej, ból brzucha, nudności, reakcje alergiczne, gorączka, niskie ciśnienie krwi.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): duszność, skurcz oskrzeli, zgaga.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): reakcje nadwrażliwości aż do wstrząsu, krwotok.

Ostrzeżenia

- W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, jak zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella, dlatego jeśli pojawią się nowe zmiany skórne należy pilnie skontaktować się z lekarzem i przerwać stosowanie leku. Należy zachować ostrożność u pacjentów z: astmą oskrzelową, chorobą wrzodową żołądka albo dwunastnicy, nietolerancją histaminy.
- Acetylcysteinum Flegamina zawiera sól i aspartam oraz sacharozę. 1 tabletkę musującą posiada 150 mg sodu, więc należy uwzględnić to w diecie pacjentów kontrolujących ilość spożywanego sodu. 1 dawka leku zawiera 20 mg aspartamu, który stanowi źródło fenyloalaniny. Może ona być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią. Ze względu na zawartość sacharozy, osoby z nietolerancją cukrów przed zastosowaniem leku powinny omówić to z lekarzem.

Producent

MERCKLE GMBH