

Aescin, 20 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek

Cena: 20,15 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki dojelitowe
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Przeciwzapalne, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aescin to lek, który działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie, a także poprawia napięcie naczyń krwionośnych.

Wskazania

- Leczenie przewlekłej niewydolności żylną, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu.
- Leczenie zapalenia żył kończyn dolnych.
- Profilaktyka i leczenie krwaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Działanie

Lek Aescin działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje skuteczność w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych. Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żyłno-limfatyczne. Lek stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka leku: 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Skład

- Substancją czynną leku jest alfa-escyna (Escinum).
- Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian. Otoczek: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110), silikonowa emulsja przeciwienna.



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aescin:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
- u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- alergiczne zapalenie skóry (świąd, wysypka, rumień, wyprysk, pokrzywka)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- ciężkie reakcje alergiczne (w niektórych przypadkach z krwawieniem);
- tachykardia,
- nadciśnienie tętnicze;
- reakcje nadwrażliwości;
- krwotok z dróg rodnych.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów):

- zawroty głowy, ból głowy;
- nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku.

Ostrzeżenia

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli po zastosowaniu leku wystąpią:

- zapalenie skóry,
- zapalenie zakrzepowe żył,
- podskórne stwardnienia (grudki pod skórą), wrzody skórne, ostry ból związany z dolegliwościami skórnymi,
- nagły obrzęk jednej lub obu nóg,
- niewydolność serca lub nerek.

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa