


Afrin ND Aerozol do nosa 15 ml



Cena: 28,39 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 ml
Postać	Aerozol
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, Katar, Zapalenie zatok
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Afrin ND jest lekiem w postaci aerozolu, który stosuje się u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia w objawowym leczeniu niedrożności nosa. Substancją czynną preparatu jest oksymetazoliny chlorowodorek. Lek zwęża naczynia krwionośne w nosie, tym samym przynosząc ulgę przy zatkanym nosie.

Działanie leku Afrin następuje już w ciągu kilku minut i utrzymuje się przez godziny. Lek przeznaczony jest do stosowania w leczeniu objawów zatkanego nosa, wywołanych kataru siennym, przeziębieniem oraz zapaleniem zatok.

Wskazania

Objawowe leczenie niedrożności nosa występującej w przebiegu kataru siennego, przeziębienia i zapalenia zatok, u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Działanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- Dorośli i dzieci powyżej 10. roku życia: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.
- Dzieci w wieku od 6. do 10 roku życia: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.
- U dorosłych nie należy stosować więcej niż 8 dawek aerozolu (u dzieci nie więcej niż 4 dawki) w ciągu 24 godzin.

Nie przekraczać zalecanych dawek. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba że na zalecenie lekarza. Ponowne podanie produktu może nastąpić po upływie kilkudniowej przerwy w jego stosowaniu.

Skład

1 ml zawiera:

- substancję czynną: oksymetazolinę chlorowodorek 0,5 mg,
- substancje pomocnicze: disodu edetynian, disodufosforan bezwodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, powidon K29-32, benzalkoniowy chlorek, makrogol 1450, woda oczyszczona, alkoholbenzylowy, celuloza mikrokrystaliczna i kameloza sodowa, aromat cytrynowy.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na chlorowodorek oksymetazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent jest leczony inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO, lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona oraz depresji). Inhibitory monoaminooksydazy mogą nasilać wzrost ciśnienia krwi wywołany przez oksymetazolinę.
- Jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) z wąskim kątem przesączania.
- Usunięta przysadka (chirurgiczne usunięcie przysadki mózgowej).
- Zapalenie skóry i śluzówki przedsionka nosa z tworzeniem się strupów (suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).
- Ostra choroba wieńcowa i lewokomorowa niewydolność serca („astma sercowa”).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

- kichanie,
- suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, jamy ustnej lub gardła,
- uczucie zatkanego nosa.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 osób):

- niepokój,
- zmęczenie,
- drażliwość,
- zaburzenia snu u dzieci,
- przyspieszone bicie serca, kołatanie serca,
- wzrost ciśnienia krwi,
- obrzęk błony śluzowej nosa,
- ból głowy,
- nudności,
- zaczerwienienie,
- wysypka,
- zaburzenia widzenia.

Interakcje

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Wykazywane przez oksymetazolinę działanie zwiększające ciśnienie krwi może być nasilone przez jednoczesne stosowanie niektórych leków przeciwdepresyjnych: trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, maprotyliny, inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitorów MAO).

Ostrzeżenia

- Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:
 - - choroba wieńcowa,
 - - nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi),
 - - nadczynność tarczycy (nadmierna aktywność gruczołu tarczycy),
 - - cukrzyca,
 - - trudności w oddawaniu moczu spowodowane rozrostem gruczołu krokowego (prostaty).

- Lek stosowany przez dłuższy okres może powodować uczucie zatkanego nosa. Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni. Jeśli po 7 dniach objawy nasilą się lub nie wystąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

