

Alantan, 20 mg/g, maść, 100 g

Cena: 31,73 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 g
Postać	Maść
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Przeznaczenie	Gojące, Łagodzące
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Alantan to lek o właściwościach nawilżających, przeznaczony do stosowania przy nadmiernym rogowaceniu skóry oraz jako wsparcie w procesie leczenia ran.

Wskazania

Maść Alantan stosuje się w przypadku: leczenia trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych); leczenia przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczeniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry); leczenia płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych.

Działanie

- Zawarta w Alantanie alantoina wpływa na skórę poprzez: działanie keratolityczne (złuszczące), stymulację wzrostu nowej tkanki, działanie osłaniające na skórę, poprawę nawilżenia skóry.
- Stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny

Dawkowanie

Alantan należy delikatnie nakładać na zmienione chorobowo miejsca 2 do 3 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Skład

- Substancją czynną jest alantoina (Allantoinum).
- 1 g maści zawiera 20 mg alantoiny.
- Substancje pomocnicze: etylu parahydroksybenzoesan (E 214), glikol propylenowy (E 1520), lanolina (tłuszcz wełny), parafina ciekła, wazelina biała, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania



Nie należy stosować maści Alantan: jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; do oczu; na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, podrażnienie skóry.

Ostrzeżenia

- Ze względu na zawartość lanoliny, glikolu propylowego, etylu parahydroksybenzoesu, produkt może powodować miejscowe podrażnienie skóry.
- Lek Alantan można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy
Chłodna 56/60
00-872 Warszawa