

Alantan Plus, (20 mg + 50 mg)/g, maść, 100 g

Cena: 33,79 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 g
Postać	Maść
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Przeznaczenie	Gojące, Łagodzące
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Maść Alantan Plus jest preparatem do stosowania miejscowego na skórę, zawierającym alantoinę i deksopantenol. Substancje te wspierają regenerację skóry, przyspieszają proces gojenia ran oraz skutecznie łagodzą podrażnienia.

Wskazania

- Zapobieganie odparzeniom u niemowląt.
- Leczenie różnego rodzaju ran, jak: otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry.
- Leczenie oparzeń słonecznych oraz oparzeń po radioterapii i fototerapii.
- Pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej.
- Nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp.
- Wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.

Działanie

- Lek zawiera dwie substancje czynne: alantoinę i deksopantenol.
- Alantoina działa złuszcząco oraz osłaniająco na skórę, poprawia jej nawilżenie oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzenie wzrostu nowej tkanki.

Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka).

- Deksoantenol głęboko wnika w skórę, gdzie przekształca się w kwas pantotenowy. Zwiększone zapotrzebowanie na kwas pantotenowy występuje w przypadku uszkodzeń i różnego rodzaju chorób skóry. Deksoantenol ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry.



Skład

- Substancjami czynnymi leku są: alantoina i deksopantenol.

1 g maści zawiera 20 mg alantoiny i 50 mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym).

- Substancje pomocnicze: lanolina (tłuszcz wełny); etylu parahydroksybenzoesan (E 214); parafina ciekła; wazelina biała; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Alantan Plus: jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę, deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; do oczu; na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.

Ostrzeżenia

- Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.
- Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Producent

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy
Chłodna 56/60
00-872 Warszawa