

Aleric Spray 140 dawek, spray do nosa, na katar alergiczny u dorosłych

Cena: 54,16 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ALERIC
Opakowanie	140 dawek
Postać	Aerozol
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aleric Spray to preparat leczniczy zawierający mometazonu furoinian, który po podaniu donosowym działa łagodząco na objawy zapalenia, takie jak kichanie, świąd, uczucie zatkanego nosa, oraz redukuje ilość wydzieliny z nosa. Lek ten jest przeznaczony do leczenia sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wskazania

Lek Aleric Spray stosuje się u osób dorosłych:

- w leczeniu objawowym sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa inaczej zwanego katarciem siennym zdiagnozowanego przez lekarza.

Działanie

Aleric Spray zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa spowodowane katarciem siennym i w ten sposób łagodzi:

- kichanie,
- uczucie zatkanego,
- swędzenie nosa lub wydzielinę z nosa.

Dawkowanie

Osoby dorosłe (po 18. roku życia): zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Skład

1 dawka Aleric Spray zawiera:



- substancja czynna: 50 mcg mometazonu furoinianu, w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego,
- pozostałe składniki: benzalkoniowy chlorek, roztwór, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować aerozolu do nosa Aleric Spray w przypadku nadwrażliwości na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz jeśli u pacjenta występuje nieleczone zakażenie nosa, opryszczka, miał uraz lub zabieg chirurgiczny nosa.

Działania niepożądane

Częste działania niepożądane: ból głowy, kichanie, podrażnienie nosa lub gardła, ból gardła, owrzodzenie błony śluzowej nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych oraz krwawienie z nosa.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aleric Spray należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica;
 - jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek inne zakażenie (grzybicze, wirusowe, bakteryjne, inne);
 - jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków;
 - jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza.
-
- Aleric Spray zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas.
 - Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 2 miesiące.
 - Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław