


Alocutan, 20 mg/ml, aerozol na skórę, 60 ml, butelka



Cena: 34,86 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	1 butelka po 60 ml
Postać	Aerozol
Producent	SUN-FARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łysienie, Wypadanie włosów
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lek Alocutan w postaci aerozolu do stosowania na skórę zawiera minoksydyl jako substancję czynną. Jest przeznaczony dla dorosłych kobiet zmagających się z łysieniem androgenowym.

Wskazania

Produkt wskazany jest dla kobiet z problemem łysienia androgenowego objawiającego się nadmiernym wypadaniem włosów i charakterystycznym, rozlanym przerzedzeniem włosów w przednio-górnej części owłosionej skóry głowy.

Działanie

Alocutan przeciwdziała postępowaniu łysienia androgenowego i pobudza wzrost nowych włosów.

Dawkowanie

Zalecana dawka dla osób dorosłych (o ile lekarz nie zaleci inaczej) to 1 ml leku na objętą zmianami powierzchnię owłosionej skóry głowy. Stosować 2 razy dziennie: rano i wieczorem przez 2-4 miesiące. W celu utrzymania efektów zaleca się dalsze stosowanie leku. Nie należy przekraczać dawki dobowej 2 ml

Skład

- Substancją czynną jest minoksydyl (Minoxidilum).
- Pozostałe składniki leku to: etanol 96% (V/V), glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania roztworu jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku, gdy pacjentka stosuje inne leki, opatrunek lub bandaż na owłosioną skórę głowy, w przypadku wystąpienia nagłej lub nierównomiernej utraty włosów. Ponadto lek jest przeciwwskazany w trakcie ciąży i karmienia piersią oraz w przypadku wystąpienia nieprawidłowości skóry głowy (łuszczyca, poparzenie słoneczne, poparzenie lub bliznowacenie, a także ogolona skóra głowy).

Leku nie należy stosować jeśli u pacjentki występują objawy zaburzeń ze strony układu krążenia lub zaburzenia rytmu serca, wysokie

ciśnienie tętnicze lub jeśli przyjmuje leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (leki przeciwnadciśnieniowe).

Działania niepożądane

- Działaniem niepożądanym występującym bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów) jest ból głowy.
- Często występującymi działaniami niepożądanymi (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) są: swędzenie, nadmierne owłosienie poza owłosioną skórę głowy (w tym wzrost włosów na twarzy), reakcje zapalne skóry (w tym wysypka trądzikopodobna oraz wysypka skórna), skrócenie oddechu, trudności w oddychaniu, obrzęk rąk i nóg, zwiększenie masy ciała, wysokie ciśnienie tętnicze, podrażnienie owłosionej skóry głowy (kłucie, pieczenie, suchość, świąd, łuszczenie się, zapalenie mieszków włosowych).
- Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) wystąpić mogą zawroty głowy i nudności.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera etanol i glikol propylenowy, dlatego wielokrotne jego rozpylanie na włosy zamiast na skórę głowy może prowadzić do zwiększonej suchości i (lub) sztywności włosów. Ponadto etanol może powodować pieczenie i podrażnienie oczu, natomiast glikol może przyczyniać się do podrażnienia skóry.
- Należy unikać wdychania leku podczas aplikacji.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

MIBE GMBH
Münchener Str. 15
Sandersdorf-Brehna, Niemcy