

Altabactin 250 IU + 5 mg Maść 20 g

Cena: 18,27 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 g
Postać	Maść
Producent	SANDOZ GMBH
Przeznaczenie	Odmrożenia, Oparzenie, Rana, Skaleczenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Altabactin to produkt leczniczy stosowany w przypadku małych ran i skaleczeń.

Wskazania

Baneocin jest wskazany w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń małej powierzchni skóry (jak np. zakażenie niewielkich ran, zakażenie skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń).

Działanie

Przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

Stosować od 2 do 3 razy na dobę.

Skład

1g maści zawiera: substancje czynne: bacytracynę 250IU, neomycynę 5mg oraz substancje pomocnicze: lanolinę i ciekłą parafinę.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Altabactin

- jeśli pacjent jest uczulony na bacytracynę, neomycynę, inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry oraz długotrwale, ze względu na ryzyko toksycznego działania leku na nerki i słuch, z utratą słuchu włącznie;

- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub nerek;
- jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej uszkodzenie narządu słuchu (przedsionka lub ślimaka);

- jeśli pacjent ma przedziurawioną błonę bębenkową (perforacja), nie należy stosować maści do ucha zewnętrznego;
- do oczu i na błony śluzowe;
- na rany głębokie lub klute, sączące zmiany chorobowe;
- ciężkie oparzenia;
- duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Ostrzeżenia

- Jeśli w trakcie stosowania leku Altabactin wystąpi reakcja uczuleniowa lub wtórne zakażenie, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza.
- Lek można stosować tylko na małej powierzchni skóry lub ran. Nie należy stosować leku w dużych dawkach, gdyż substancje czynne leku wchłonięte do krwi mogą spowodować uszkodzenie nerek i słuchu.
- Należy unikać przebywania na słońcu oraz opalania się (w tym także w solarium) podczas stosowania leku, ponieważ może on powodować uczulenie na światło słoneczne i reakcje fototoksyczne.
- Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić przed światłem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

SANDOZ
Domaniewska 50c
Warszawa

Galeria

