

Altacet 1 g Lek na obrzęki po stłuczeniach 6 sztuk

Cena: 13,58 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ALTACET
Opakowanie	6 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	SANDOZ GMBH
Przeznaczenie	Obrzęk, Opuchlizna, Stłuczenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Altacet Tabletki to produkt leczniczy stworzony do przygotowywania roztworu stosowanego na skórę. Głównym składnikiem aktywnym w leku jest octanowinian glinu. Po zastosowaniu miejscowym na skórę, substancja ta działa ściągająco i łagodzi ból w obszarze stanu zapalnego.

Mechanizm działania Altacetu w tabletkach obejmuje rozluźnianie naskórka, co skutkuje zmniejszeniem obrzęku tkanek i jednoczesnym łagodzeniem objawów stanu zapalnego. Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania na skórę i jest odpowiedni zarówno dla dorosłych, jak i dzieci w wieku od 3 lat, zwłaszcza w przypadku stłuczeń tkanek i stawów spowodowanych urazami mechanicznymi.

Wskazania

- Stłuczenia tkanek i stawów.
- Obrzęk tkanek.

Działanie

- Ściągająco, co łagodzi ból w obrębie ogniska zapalnego.
- Rozpulchniająco, co zmniejsza obrzęk tkanek i łagodzi objawy stanu zapalnego.

Dawkowanie

- Dzieci od 3 do 6 lat: stosować 1 okład w ciągu doby.
- Dorośli: okłady, kompresy i opatrunki należy stosować w odstępach kilkugodzinnych tak, aby nie dopuścić do ich wyschnięcia.

Skład

1 tabletką zawiera:

- substancję czynną: 1g octanowinianu glinu,
- substancje pomocnicze: kwas borowy, krospowidon, sodu stearylofumaran.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Altacet:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na octanowinian glinu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;
- Na rozległe lub sączące się rany; na zmienioną chorobowo skórę;
- Długotrwanie.
- Nie stosować doustnie!

Ostrzeżenia

- Podczas stosowania leku na duże powierzchnie skóry lub długotrwałego stosowania, mogą wystąpić objawy maceracji skóry.
- W przypadku wystąpienia objawów uczulenia lub zmian na skórze należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.
- Należy unikać kontaktu roztworu z oczami i błonami śluzowymi.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa

Galeria

