

ALTE Syrop prawoślazowy 2,36 g/5ml, 125g

Cena: 6,68 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	125 g
Postać	Syrop
Producent	GEMI P.P.F. GRZEGORZ NOWAKOWSKI
Przeznaczenie	Łagodzące, Osłaniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Sirupus Alte to tradycyjny syrop prawoślazowy, zawierający macerat z korzenia prawoślazu lekarskiego. Jest stosowany w leczeniu podrażnień błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz przy suchym kaszlu.

Wskazania

Syrop prawoślazowy stosuje się jako środek łagodzący objawy podrażnień błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz związany z tym suchy kaszel.

Działanie

Tradycyjne działanie syropów, zawierających maceraty z korzenia prawoślazu tłumaczy się działaniem osłaniającym na błonę śluzową jamy ustnej oraz gardła i łagodzeniem stanów podrażnienia. Substancją czynną syropu jest wyciąg wodny (macerat) z korzenia prawoślazu, który zawiera jako główne składniki śluzu o charakterze kwaśnym. Śluz korzenia prawoślazu tworzy roztwory koloidalne, które pokrywają błony śluzowe cienką warstwą i działają na nie ochronnie. Dzięki temu śluz działa osłaniająco na zmienioną błonę śluzową gardła oraz łagodzi kaszel. Jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 3-6 lat: 5 ml, dawkę można stosować do 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 6-12 lat: 5 ml, dawkę można stosować do 3 razy na dobę.
- Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 10 ml, dawkę można stosować od 3 do 4 razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest macerat z korzenia prawoślazu lekarskiego.
- Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas benzoesowy. Zawartość etanolu w produkcie nie więcej niż 0,8% m/m (1,0% V/V)



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sirupus Alte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas benzoesowy i jego pochodne.

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie leczenia syropem, jeśli pacjent choruje na: astmę, cukrzycę, nietolerancję niektórych cukrów.
- Syrop prawoślazowy zawarty w leku może opóźniać wchłanianie niektórych leków, dlatego zaleca się zachowanie ½ do 1 godziny odstępu podczas przyjmowania innych produktów leczniczych.
- Lek zawiera sacharozę w związku z tym należy go ostrożnie stosować u chorych na cukrzycę. 5 ml syropu zawiera 4,2 g sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek zawiera 0,8% m/m (1,0% V/V) etanolu (alkoholu), tzn. do 131 mg na dawkę 10 ml, co jest równoważne ok. 3,3 ml piwa lub ok. 1,3 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Dawka stosowana u dzieci zawiera małą ilość alkoholu - mniej niż 100 mg na dawkę.

Producent

GEMI
Mickiewicza 36
Karczew