

Alugastrin Dihydroxyaluminii natrii carbonas 340 mg Lek o smaku miętowym 40 sztuk

Cena: 21,65 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ALUGASTRIN
Opakowanie	40 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nadkwaśność, Refluks, Wrzody, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Alugastrin to lek neutralizujący nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym. Nie powoduje nadmiernej zasadowości soku żołądkowego i nie pobudza dodatkowego wydzielania kwasu solnego. Działa ochronnie na błony śluzowe przełyku, żołądka i dwunastnicy. Pomaga złagodzić ból związany z nadmierną kwasowością żołądka.

Alugastrynę można stosować objawowo w różnych schorzeniach żołądkowo-jelitowych. Jest szczególnie wskazany w przypadku nadkwaśności żołądka i sporadycznej choroby refluksowej przełyku (GERD), która objawia się takimi objawami, jak zgaga, zarzucanie kwasu i cofanie się treści żołądkowej do przełyku. Produkt leczniczy Alugastrin można stosować także w przypadku uszkodzeń błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanych czynnikami wrzodującymi. Przykładem takiego czynnika jest stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), powszechnie stosowanych jako leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, zwłaszcza podczas przeziębień. Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku poprawy po 14 dniach u dorosłych lub po 7 dniach u dzieci lub jeśli stan pacjenta się pogorszy, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Lekarz będzie w stanie ocenić sytuację, zdiagnozować problem i ewentualnie zalecić dalsze kroki lub zmiany w planie leczenia.

Wskazania

Nadkwaśność soku żołądkowego, uszkodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołane przez czynniki wrzodotwórcze, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Działanie

Zobojętniające nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym, osłaniające na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. Łagodzi dolegliwości bólowe w nadkwasocie.

Dawkowanie

Lek stosuje się doustnie. Dawkowanie Alugastrinu u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia to rozgryźć lub żuć 1 lub 2 tabletki godzinę

po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.

Skład

1 tabletkę zawiera: substancję czynną: węgiel dihydroksyglinowo-sodowy 340mg oraz substancje pomocnicze: mannitol, skrobia ziemniaczana, karmeloza sodowa, magnezu stearynian, substancja poprawiająca smak i zapach miętowa, sacharyna sodowa.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Alugastrinu u osób z nadwrażliwością na węgiel dihydroksyglinowo-sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku stanowi ciężka niewydolność nerek.

Ostrzeżenia

- Stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zapańc.
- Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku może doprowadzić do hipofosfatemii.
- Alugastrin zawiera sód, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria



Alugastrin®
PODWÓJNE DZIAŁANIE:

szybko usuwa zgagę

osłania żołądek przed podrażnieniami



DZIAŁANIE:

Alugastrin®

- **Zobojętnia nadmiar kwasu solnego** w soku żołądkowym.
- **Działa osłaniająco na błonę śluzową** przełyku, żołądka i dwunastnicy.
- **Łagodzi dolegliwości bólowe** związane z nadkwaśnością soku żołądkowego.



WSKAZANIA:

Do stosowania objawowo:

- w nadkwaśności soku żołądkowego;
- w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne);
- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.



Poczuj ulgę.
Zapewnij ochronę.

Alugastrin®

40 tabletek

EKONOMICZNE OPAKOWANIE



Alugastrin®

Alugastrin, 340 mg, tabletki do rozgrzymania i żucia, Lek OTC. Skład: każda tabletkę zawiera 340 mg dihydroksyglinowo-sodowego węgla. Wskazania: Objawowe wradności soku żołądkowego w uszkodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, w chorobach wrzodowej żołądka i dwunastnicy). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na któryśkolwiek z składników pomocniczych. Ciężka niewydolność nerek. Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

ALUGASTRIN 1005

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Alugastrin®

40 tabletek

ZGAGA OSŁONA ŻOŁĄDKA

40 TABLETEK