

Ambroksol 30 mg/5 ml, syrop, smak bananowy, 150 ml



Cena: 9,29 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	150 ml
Postać	Syrop
Producent	TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Kaszel
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ambroksol Takeda to syrop o bananowym smaku, przeznaczony do leczenia ostrych i przewlekłych chorób dróg oddechowych. Wspomaga wydzielanie śluzu oskrzelowego i zmniejsza jego lepkość.

Wskazania

Lek Ambroksol Takeda stosuje się w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny w drogach oddechowych, takich jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, stany zapalne nosa i gardła, mukowiscydoza. Ambroksolu chlorowodorek należy do grupy leków o działaniu pobudzającym wydzielanie śluzu oskrzelowego oraz zmniejszających jego lepkość.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza, lub farmaceuty. Dzieci w wieku: 1 do 2 lat: 1,25 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) - 2 razy na dobę; 2 do 5 lat: 1,25 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) - 3 razy na dobę; 6 do 12 lat: 2,5 ml syropu (15 mg ambroksolu) - 2 do 3 razy na dobę. Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 5 ml syropu (30 mg ambroksolu) do 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni, a następnie 5 ml syropu 2 razy na dobę. Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Ambroksol Takeda nie należy stosować na noc.

Skład

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek (Ambroxoli hydrochloridum). 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodoru. Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekryształujący, glicerol 85%, kwas benzoowy, kwas propionowy, esencja bananowa, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ambroksol Takeda: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli u pacjenta występuje skurcz oskrzeli.

Ostrzeżenia



Lek należy szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli. U pacjentów z astmą oskrzelową lek może początkowo nasilać kaszel. Lek stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy i owrzodzeniem jelit. Lek Ambroksol Takeda zawiera sorbitol, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Nie zaleca się podawania leku bezpośrednio przed snem. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać, chronić od światła. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności. Lek stosować ostrożnie u dzieci w wieku od 1 do 5 lat.

Producent

Takeda Pharma
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa