

# Ambrosol Teva 15 mg/5 ml Lek wykrztuśny syrop 200 ml



Cena: 21,19 zł

## Opis słownikowy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn     |
| Opakowanie      | 200 ml                                    |
| Postać          | Syrop                                     |
| Producent       | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.   |
| Przeznaczenie   | Wykrztuśne                                |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                           |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży |

## Opis produktu

### Opis

Syrop **Ambrosol Teva** zawiera ambroksol chlorowodorek jako substancję czynną, która działa wykrztuśnie i mukolitycznie, co oznacza, że rozrzedza śluz. Ten lek zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych, redukuje jego lepkość, przyspiesza transport wydzieliny w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

### Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej, takie jak: ostre i zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli.

### Działanie

Wykrztuśne i mukolityczne (rozrzedza śluz) - zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego lepkość, przyspiesza transport wydzieliny w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 30 mg ambroksolu chlorowodoru (10 ml syropu, czyli 2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę, następnie dawkę należy zmniejszyć do 30 mg (10 ml syropu, czyli 2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 15 mg ambroksolu chlorowodoru (5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa) 2 do 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 7,5 mg ambroksolu chlorowodoru (2,5 ml syropu, czyli ½ łyżki miarowej) 3 razy na dobę.

### Skład

5ml syropu zawiera substancję czynną 15mg ambroksolu chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: sorbitol płynny 70% (E420), glicerol (E422), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ambrosol Teva:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowodrek, bromoheksynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- jeśli u pacjenta stwierdzono dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji substancji pomocniczych;
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

#### Działania niepożądane

Częste działania niepożądane: zaburzenia smaku (np. zmiana smaku), nudności, osłabienie czucia (niedoczulica) w obrębie jamy ustnej i gardła.

#### Ostrzeżenia

- Lek Ambrosol Teva zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, glikol propylenowy, sorbitol. Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i propylu oraz glikolu propylenowego, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). 5 ml syropu zawiera 2,25 g sorbitolu. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek Ambrosol Teva może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
- Wartość kaloryczna sorbitolu wynosi 2,6 kcal/g.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

#### Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA  
Emilii Plater 53  
Warszawa