

Ambrosol Teva 30 mg/5 ml Lek wykrztuśny syrop 120 ml



Cena: 16,37 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	120 ml
Postać	Syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Ambrosol Teva to syrop leczniczy dedykowany dla osób dorosłych, którego zastosowanie obejmuje łagodzenie kaszlu mokrego poprzez rozrzedzenie gromadzącej się wydzieliny w drogach oddechowych.

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z utrudnionym odkrztuszaniem lepkiej wydzieliny oskrzelowej.

Działanie

Wykrztuśne i mukolityczne.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie, przez pierwsze 2 do 3 dni należy stosować 5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa (30 mg) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 30 mg (5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa) 2 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: doustnie, 2,5 ml syropu, czyli 1/2 łyżki miarowej (15 mg) 2 do 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: doustnie, 1,25 ml syropu, czyli 1/4 łyżki miarowej (7,5 mg) 3 razy na dobę.

Skład

5 ml syropu Ambrosol 30 mg/ 5 ml (1 łyżka miarowa) zawiera:

- substancję czynną: 30 mg ambroksolu chlorowodoru,
- substancje pomocnicze: sorbitol płynny 70% (E420), glicerol (E422), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoosan (E218), propylu parahydroksybenzoosan (E216), aromat malinowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Ambrosol Teva jeśli:

- u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksol, bromohexynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

- Często: zaburzenia smaku (np. zmiana smaku), nudności, osłabienie czucia (niedoczulica) w obrębie jamy ustnej i gardła.
- Niezbyt często: wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to lekarzem lub farmaceutą u pacjentów z: chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy z powodu niekorzystnego wpływu ambroksolu na błonę śluzową żołądka, osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli, ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.
- Upłynnienie dużej ilości wydzieliny u pacjentów unieruchomionych i w ciężkim stanie oraz u małych dzieci musi być związane z jej odsysaniem. U takich pacjentów nie należy podawać leków hamujących odruch kaszlu, ponieważ może dojść do nagromadzenia się wydzieliny w drogach oddechowych.
- Wydzielinę oskrzelową należy dokładnie odkrztuszać. U pacjentów z astmą oskrzelową ambroksol może początkowo nasilać kaszel.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
- Chronić od światła i wilgoci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania to 28 dni.

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa