

Ambrosol Teva syrop 15 mg/5ml 120 ml



Cena: 14,47 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	120 ml
Postać	Syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Ambrosol Teva to syrop leczniczy przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 2. roku życia. Głównym składnikiem czynnym preparatu jest chlorowoderek ambroksolu, który działa wykrztuśnie i mukolitycznie. Poprzez rozrzedzenie śluzu zmniejsza jego lepkość, co ułatwia wydalanie go z dróg oddechowych, przyspiesza transport wydzieliny, ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel. Syrop jest zalecany w przypadku ostrej i przewlekłej choroby dróg oddechowych, gdy występuje utrudnione usuwanie lepkiego śluzu oskrzelowego, takich jak: Ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, Astma oskrzelowa, Mukowiscydoza, Rozedma płuc, Rozstrzeń oskrzeli.

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z utrudnionym odkrztuszaniem lepkiej wydzieliny oskrzelowej.

Działanie

Wykrztuśne i mukolityczne.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 30 mg ambroksolu chlorowodoru (10 ml syropu, czyli 2 łyżki miarowe) trzy razy na dobę, a następnie tą samą dawkę przyjmować dwa razy na dobę.
- Dzieci od 6 do 12 lat: 15 mg ambroksolu chlorowodoru (5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa) 2 do 3 razy na dobę.
- Dzieci od 2 do 6 lat: 7,5 mg ambroksolu chlorowodoru (2,5 ml syropu, czyli pół łyżki miarowej) 3 razy na dobę.

Skład

5 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: ambroksolu chlorowoderek 15 mg,
- inne składniki: sorbitol płynny 70% (E420), glicerol (E422), kwas cytrynowy jednowodny (E330), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ambrosol Teva?

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksol, bromohexynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ambrosol Teva.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane:

- zaburzenia smaku (np. zmiana smaku),
- nudności,
- osłabienie czucia (niedoczulica) w obrębie jamy ustnej i gardła.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność,
- suchość w jamie ustnej. Rzadko występujące działania niepożądane:
- zgaga,
- wysypka, pokrzywka.

Ostrzeżenia

- Stosować ostrożnie u osób z chorobą wrzodową.
- Stosować ostrożnie u osób z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli, ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.
- Ze względu na zawartość parahydroksybenzoenu metylu i propylu oraz glikolu propylenowego, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Lek Ambrosol Teva może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Chronić od światła.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa