

Anacard Medica Protect, 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 tabletek

Cena: 17,42 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwwzakrzepowe, Rozrzedzające krew
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tabletki dojelitowe Anacard Medica Protect to lek mający na celu zapobieganie zlepianiu się płytek krwi. Zawierają one kwas acetylosalicylowy i są przeznaczone do długotrwałego stosowania w leczeniu schorzeń, które zwiększają ryzyko zakrzepów i zatorów naczyń krwionośnych. Dzięki specjalnej formie tabletek dojelitowych, kwas acetylosalicylowy uwalnia się dopiero w jelicie, co zmniejsza ryzyko podrażnienia błony śluzowej żołądka.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania Anacard Medica Protect jest choroba wieńcowa, inaczej choroba niedokrwienna serca, oraz wszelkie sytuacje kliniczne, gdzie celowe jest ograniczenie agregacji płytek krwi, jak: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, przebyty epizod niestabilnej choroby wieńcowej, prewencja wtórna u osób po przebyłym zawałowi serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwinnego udaru mózgu u pacjentów z TIA, po przebyłym udarze niedokrwinnym mózgu u pacjentów z TIA, u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.

Działanie

Działanie Anacard Medica Protect polega na zmniejszaniu zlepianiu się (agregacji) płytek krwi, co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów oraz zatorów w naczyniach krwionośnych. Zawarty w leku kwas acetylosalicylowy może działać drażniaco na błonę śluzową żołądka, jednak dzięki formie tabletek dojelitowych działanie to jest ograniczone, gdyż rozpadają się one dopiero w jelicie.

Dawkowanie

Lek podaje się doustnie. Dawkowanie Anacard Medica Protect to zwykle 1 tabletka raz dziennie, połyknięta w całości. Wyjątek stanowi świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, kiedy podaje się 4 tabletki jednorazowo i należy je rozgryźć bardzo dokładnie, aby lek jak najszybciej wchłonął się.

Skład

- Substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy.
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia żelowana kukurydziana, talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 6 171), triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, trietylu cytrynian, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan.

Przeciwwskazania

Nie stosować Anacard Medica Protect u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest: skaza krwotoczna; czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy; ciężka niewydolność serca lub wątroby albo nerek; występowanie w przeszłości napadów astmy oskrzelowej wywołane przez salicylany lub innych związków o podobnym działaniu, np. NLPZ.

Działania niepożądane

- Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność.
- Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja; przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz); wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu; po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego zanotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.
- Bardzo rzadko (rzadziej niż 1 na 10 000 pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Ostrzeżenia

- Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.
- Zawarty w leku kwas acetylosalicylowy może wywoływać skurcz oskrzeli oraz napady astmy oskrzelowej czy inne reakcje nadwrażliwości. Na tego typu reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z: astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, polipami błony śluzowej nosa, katarzem siennym jak również osoby z reakcjami nadwrażliwości na inne substancje (jak świąd, pokrzywka).
- Przed zabiegami chirurgicznymi, w tym usunięciem zęba, należy poinformować lekarza o stosowaniu Anacard Medica Protect. W przypadku planowanych zabiegów należy odstawić lek 5 dni wcześniej.
- Nawet małe ilości kwasu acetylosalicylowego zmniejszają wydalanie kwasu moczowego, więc w przypadku pacjentów ze skłonnością do takiego typu problemów, Anacard Medica Protect może wywołać atak dny moczowej.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław