

AntyGrypin dzień, tabletki musujące, 10 tabletek

Cena: 31,89 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ANTYGRYPIN
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki musujące
Producent	NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

AntyGrypin Dzień to lek w formie tabletek musujących, który nastąpił w przypadku wystąpienia grypy i przeziębienia. Zawiera trzy aktywne składniki: kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie, witaminę C, uzupełniającą jej niedobory w okresie pobierania spożycia, oraz kofeinę, która działa przeciwbólowo skład acetylosalicylowego.

Wskazania

AntyGrypin dzień stosuje się w doraźnym leczeniu objawów grypy i przeziębienia, jak:

- ból głowy,
- stawów, mięśni,
- gorączka.

Działanie

AntyGrypin dzień zawiera 3 substancje czynne o kompleksowym działaniu:

- kwas acetylosalicylowy - wykazuje właściwości przeciwgorączkowe, przeciwzapalne oraz przeciwbólowe,
- witaminę C (kwas askorbowy) uzupełnia jej niedobory podczas zwiększonego zapotrzebowania w okresie obniżonej odporności,
- kofeina powoduje wzmocnienie działania przeciwbólowego kwasu acetylosalicylowego.

Dawkowanie

Dorośli: 1 do 2 tabletek jednorazowo lub kilka razy na dobę.
Przyjmować nie więcej niż 5 tabletek na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum), witamina C (kwas askorbowy) (Acidum ascorbicum), kofeina (Coffeinum).
- Substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol, skrobia kukurydziana, powidon, sodu cyklamianian, sacharyna sodowa, substancja poprawiająca smak i zapach cytrynowa, żółcień chinolinowa (E 104).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku AntyGrypin dzień:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu,
- u osób z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stanów zapalnych przewodu pokarmowego,
- u pacjentów ze skłonnością do krwawień,
- przy zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej (w przebiegu cukrzycy, mocznicy),
- u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej, katarzem siennym z polipami błony śluzowej nosa wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o

podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

- u osób z: niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością serca,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci i młodzieży do 16 lat
- podczas jednoczesnego stosowania metotreksatu w dawkach 15mg na tydzień lub większych.

Działania niepożądane

AntyGrypin dzień może powodować następujące skutki uboczne:

- bóle brzucha, nudności, wymioty,
- jawne krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych stolców lub utajone krwawienia z przewodu pokarmowego,

które mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza,

- owrzodzenie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, perforacja,
- rzadkie reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, odczyny skórne, obrzęk naczynioruchowy, napad astmy oskrzelowej,
- rzadko występujące: zmniejszenie liczby płytek krwi, zaburzenia krzepnięcia krwi, wydłużenie czasu krwawienia,
- przejściowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
- nadmierne pocenie, zawroty głowy, szumy uszne,
- kamica moczowa, kolka nerkowa martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek,
- bezsenność, niepokój, bóle i zawroty głowy związane z kofeiną zawartą w leku,
- niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Ostrzeżenia

- Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent posiada kłopoty z sercem, przeżył udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu).
- Leku AntyGrypin dzień nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem.
- Lek zawiera sorbitol, więc należy zachować ostrożność u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (wrodzone zaburzenie metaboliczne) a także z nadwrażliwością na leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące.
- AntyGrypin dzień należy stosować ostrożnie u pacjentów: u których w przeszłości stwierdzono chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nadciśnieniem tętniczym (ze względu na zawartość kofeiny).
- Lek zawiera 460,1 mg sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Producent

NATUR PRODUKT PHARMA
Podstoczysko 30
Ostrów Mazowiecka