

Anusir czopki doodbytnicze, 10 sztuk



Cena: 37,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ANUSIR
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopki
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Hemoroidy, Obrzęk, Stan zapalny, suchość, Świąd
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Anusir to wyrób medyczny w postaci czopków doodbytniczych, które są przeznaczone do stosowania miejscowego w okolicy odbytu. Czopki są umieszczone w oddzielnych przegródkach folii z dodatkami. Przegródka jest oddzielną perforacją, co umożliwia rozdzielenie jednego czopka od pozostałych opakowań. Po zastosowaniu czopka w odbycie, zagrożenie w czopku stosowania stopieniu, tworzący żel o działaniu nawilżającym i tworzącym barierę energetyczną.

Składniki

1 czopek o masie 2 g zawiera: 10 mg soli sodowej kwasu hialuronowego oraz tłuszcz obojętny jako substancję pomocniczą.

Zastosowanie

Do stosowania doodbytniczego, w celu nawilżenia i ochrony błony śluzowej, w stanach wymagających pobudzenia naturalnych procesów regeneracji i gojenia się błony śluzowej odbytnicy oraz kanału odbytu. Sytuacje takie występują w następujących przypadkach: po zabiegach lub operacjach chirurgicznych, także podczas radioterapii, w stanach zapalnych, z towarzyszącym świądem, obrzękiem, zaczerwienieniem, w żyłkach odbytu, w pęknięciach i szczelinach odbytu powstałych na skutek zaparć.

Sposób użycia

- Przed założeniem czopka należy dokładnie umyć ręce.
- Ostrożnie wyjąć czopek z folii.
- Delikatnie wepchnąć czopek w odbyt.

Przeciwwskazania

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane



Jeśli po zastosowaniu produktu wystąpiło nasilenie zmian lub pojawiły się dodatkowe objawy chorobowe należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Czopki przeznaczone są do podania odbytniczego - nie stosować w inny sposób.
- Jeśli po zastosowaniu produktu wystąpiło nasilenie zmian lub pojawiły się dodatkowe objawy chorobowe należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.
- Jeśli po zastosowaniu produktu nastąpi złagodzenie dolegliwości, a następnie nastąpi powrót nieprawidłowości, nie należy wznowiać stosowania, lecz zwrócić się do lekarza.