

Apap migrena, 250 mg + 250 mg + 65 mg, tabletki powlekane, 20 tabletek

Cena: 40,57 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	APAP
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

APAP Migrena to lek trójskładnikowy, zawierający paracetamol, kwas acetylosalicylowy i kofeinę. Paracetamol działa przeciwbólowo i obniża gorączkę, natomiast kwas acetylosalicylowy ma podobne właściwości, dodatkowo działając przeciwzapalnie. Kofeina zawarta w leku delikatnie pobudza i wzmacnia działanie przeciwbólowe pozostałych składników.

Wskazania

APAP migrena stosowany jest doraźnie u dorosłych do leczenia bólu głowy oraz migren (często towarzyszy im nadwrażliwość na światło, dźwięki, nudności, uniemożliwienie normalnego funkcjonowania) z aurą i bez aury.

Działanie

W APAP migrena znajdziemy połączenie trzech substancji: paracetamolu (przeciwbólowo, przeciwgorączkowo), kwas acetylosalicylowy (przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, hamuje agregację płytek krwi) i kofeiny (pobudzająco, wzmacnia działanie przeciwbólowe pozostałych substancji czynnych). Jest to lek złożony, którego składniki zostały dobrane tak aby zwiększyć skuteczność działania przeciwbólowego.

Dawkowanie

- Ból głowy: stosuje się 1 tabletkę, którą należy popić szklanką wody. Jeśli występuje taka konieczność, to kolejną dawkę można przyjąć po 4-6 godzinach. Jeśli ból jest wyjątkowo silny, można stosować 2 tabletki zamiast jednej. W leczeniu bólu głowy nie można leku stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji lekarskiej.
- Migrena: stosuje się dwie tabletki, które należy popić szklanką wody. Kolejną dawkę można przyjąć po 4-6 godzinach (w razie potrzeby). Nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji lekarskiej.

Skład

- Substancje czynne: paracetamol, kwas acetylosalicylowy, kofeina.
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, kwas stearynowy 50; Otoczka: Forcoat White W010 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, kwas benzoesowy), wosk Carnauba.

Przeciwwskazania

- APAPu migrena nie powinno się stosować jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek ze składników leku. Także jeśli stwierdzono wcześniej reakcje alergiczne na inne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub przeciwgorączkowe (NLPZ np. kwas acetylosalicylowy i salicylany, diklofenak, ibuprofen).
- Leku nie powinno się również stosować u pacjentów z owrzodzeniem żołądka, jelit, lub jeżeli w przeszłości występowało owrzodzenie układu pokarmowego, jeżeli występuje krew w stolcu lub czarne stolce (objawy krwawienia lub perforacji żołądkowo-jelitowych), w przypadku hemofilii lub występowania innych chorób krwi, w ciężkich schorzeniach serca, wątroby lub nerek, podczas przyjmowania ponad 15 mg metotreksatu tygodniowo oraz w trzecim trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

- Często (występują u 1 na 10 pacjentów) Nerwowość, zawroty głowy; Nudności, dolegliwości w obrębie jamy brzusznej.
- Niezbyt często (występują u 1 na 100 pacjentów) Bezsenność, drżenie, odrętwienie, ból głowy; Szum w uszach; Uczucie suchości w jamie ustnej, biegunka, wymioty; Zmęczenie, uczucie zaniepokojenia; Przyspieszone bicie serca.
- Rzadko (występują u 1 na 1000 pacjentów) Ból gardła, trudności z przełykaniem, odrętwienie i mrowienie dookoła ust, nadmierne wydzielanie śliny; Zmniejszony apetyt, zaburzenia smaku; Niepokój, nastrój euforyczny, uczucie napięcia; Zaburzenia uwagi, utrata pamięci, zaburzona koordynacja; Uczucie bólu w okolicy czoła i policzków; Ból oczu, zaburzenia widzenia; Uderzenia gorąca, problemy z naczyniami obwodowymi (np. w rękach lub nogach); Krwawienie z nosa, płytki i spowolniony oddech, katar; Wzdęcia, odbijanie się; Nadmierne pocenie się, swędzenie, swędząca wysypka, zwiększona wrażliwość skóry; Sztywność mięśni, kości lub stawów, ból szyi, ból pleców, skurcze mięśni; Osłabienie, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej.

Ostrzeżenia

Należy skonsultować się z lekarzem zanim zastosuje się lek, jeśli:

- u pacjenta wcześniej nie zdiagnozowano migreny, gdyż w takim przypadku przed zastosowaniem leku należy wykluczyć inne potencjalnie poważne dolegliwości związane z mózgiem lub układem nerwowym.
- migrena jest tak ciężka, że konieczne jest położenie się do łóżka, lub z powodu bólu różniącego się od migren występujących zwykle, lub jeśli bólem migrenowym towarzyszą wymioty.
- występują bóle głowy po urazie lub spowodowane urazem głowy, przemęceniem, kaszlem lub pochyloną pozycją.
- bóle głowy występują przewlekłe (15 lub więcej dni w miesiącu przez dłużej niż 3 miesiące) lub jeśli bóle głowy wystąpiły po raz pierwszy po 50 roku życia.

pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami, niedowagę, jest niedożywiony lub jeśli pacjent regularnie pije alkohol. Może być konieczne całkowite

- zaprzestanie stosowania leku lub ograniczenie ilości przyjmowanego paracetamolu.
- pacjent ma ciężką infekcję, jest poważnie niedożywiony, ma dużą niedowagę lub przewlekłe nadużywa alkoholu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko kwasicy metabolicznej.
- występuje dziedziczny niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, który ma wpływ na czerwone krwinki. W wyniku tego, po spożyciu pewnego rodzaju żywności i zażyciu innych leków przeciwzapalnych (w tym kwasu acetylosalicylowego) może rozwinąć się niedokrwistość, żółtaczkę, może dojść do powiększenia śledziony lub wystąpienia innych chorób.
- kiedykolwiek wystąpiły schorzenia układu pokarmowego, takie jak wrzody żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego lub czarne stolce. Jeśli u pacjenta w przeszłości występowało uczucie dyskomfortu w żołądku lub zgaga po zażyciu leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych.
- występują zaburzenia krwawienia lub nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych inne niż krwawienia miesięczne (np. nienaturalnie obfite i przedłużone krwawienia miesięczne).
- pacjent przeszedł niedawno zabieg chirurgiczny (także drobny jak np. chirurgiczny zabieg dentystyczny) albo w ciągu kolejnych 7 dni podda się zabiegowi chirurgicznemu.
- występuje astma oskrzelowa, katar sienny, polipy w nosie, przewlekła obturacyjna choroba płuc lub występują objawy wskazujące na alergię (reakcje skórne, swędzenie, pokrzywka).



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- występuje skaza moczanova, cukrzyca, nadczynność tarczycy, zaburzenia rytmu serca, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności nerek lub wątroby.
- występują problemy z nadużywaniem alkoholu.
- pacjent stosuje obecnie inne leki zawierające kwas acetylosalicylowy lub paracetamol, albo zażywa inne leki, ponieważ część leków może oddziaływać ze składnikami leku APAP migrena i powodować działania niepożądane.
- występuje ryzyko odwodnienia (np. z powodu wymiotów, biegunki, przed lub po poważnej operacji).

Producent

US PHARMACIA WROCLAW
Ziębicka 40
Wrocław