

Apteo Med Xylometazolin 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór, 10 ml



Cena: 8,68 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	10 ml (but.)
Postać	Roztwór
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Katar
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Xylometazolin APTEO MED to preparat, którego substancją czynną jest ksylometazoliny chlorowodorek. Lek działa miejscowo, obkurczając naczynia krwionośne, co prowadzi do zmniejszenia przekrwienia, obrzęku błony śluzowej nosa oraz ilości wydzieliny. Dzięki temu wspomaga oddychanie przez nos u pacjentów z uczuciem jego zatkania.

Preparat umożliwia również odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych, a także może być stosowany wspomagająco w przypadku zapalenia ucha środkowego dzięki redukcji przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej. Krople ułatwiają badanie jamy nosowej (wziernikowanie nosa).

Działanie leku rozpoczyna się już po 2 minutach od jego użycia i utrzymuje się do 10 godzin. Xylometazolin APTEO MED jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat.

Wskazania

Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 lub 2 krople roztworu Xylometazolin APTEO MED do każdego otworu nosowego 1 do 2 razy na dobę (co 8 do 10 godzin). Nie należy stosować więcej niż 2 dawki leku do każdego otworu nosowego na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem dorosłych): 2 do 4 krople roztworu Xylometazolin APTEO MED do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę, w razie konieczności. Nie należy stosować więcej niż 3 dawki leku do każdego otworu nosowego na dobę.

Skład

Substancją czynną leku Xylometazolin APTEO MED jest ksylometazoliny chlorowodorek.



Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodoru, co odpowiada 0,012 – 0,016 mg/kroplę ($0.014 \pm 15\%$).
Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, roztwór, disodu fosforan dwuwodny, potasu diwodorofosforan, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta)
- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku)
- jeśli u pacjenta błona śluzowa nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa)

Działania niepożądane

- Trudności w oddychaniu lub przełykaniu
- Opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła
- Świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami

Ostrzeżenia

- Zaleca się, aby ostatnią dawkę leku przyjąć bezpośrednio przed snem.
- Leku Xylometazolin APTEO MED nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni.

Producent

SYNOPTIS PHARMA