

Aquavag, globulki dopochwowe, 10 globulek

Cena: 20,47 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	10 globulek
Postać	Globulki dopochwowe
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aquavag to globulki dopochwowe, wyrób medyczny, który nawilża i łagodzi objawy suchości pochwy. Rekomendowany jest szczególnie dla kobiet stosujących doustną antykoncepcję, w okresie okołomenopauzalnym oraz odczuwających dyskomfort lub ból podczas stosunków.

Wskazania

Produkt wskazany do stosowania, w przypadku:

- suchości okolic intymnych (wynikających z przyjmowania doustnej antykoncepcji hormonalnej lub z przekwitania),
- odczuwalnego dyskomfortu (spowodowanego zaczerwienieniem, swędzeniem, pieczeniem okolic intymnych),
- bólesności podczas zbliżeń,
- wspomagająco (po zabiegach ginekologicznych, chemio- i radioterapii), w celu odbudowy uszkodzonego nabłonka pochwy,
- profilaktycznie, w celu ochrony przed podrażnieniami i otarciami.

Działanie

Działanie wyrobu medycznego Aquavag opiera się na nawilżających właściwościach hialuronianu sodu, który stanowi czynny składnik preparatu. Substancja ta pomaga łagodzić podrażnienia, zmniejsza objawy pieczenia i chroni śluzówkę pochwy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Skład

Sól sodowa kwasu hialuronowego (15 mg), tłuszcz stały.

Stosowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować 1 globulkę dziennie, najlepiej na noc, przez 7 kolejnych dni.

W przypadku kuracji podtrzymującej zaleca się stosowanie 1 globulki co 2-3 dni lub zgodnie z zaleceniem lekarza.



Sposób użycia

- Wyjąć globulkę z wytłoczki a następnie delikatnie włożyć ją do pochwy, jeśli to możliwe, jak najgłębiej.
- Najkorzystniejszą pozycją do wykonania tej czynności jest pozycja leżąca na plecach ze zgiętymi nogami.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z treścią jego instrukcji użycia.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwagi

Preparatu nie należy stosować podczas menstruacji.

Producent

FARMINA
Lipska 44
Kraków