

Ascodan 400 mg + 8 mg, 10 tabletek

Cena: 14,00 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Ból
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tabletki **Ascodan** są wskazane do stosowania w stanach gorączkowych, przeziębieniach oraz różnego rodzaju bólach, takich jak bóle głowy, stawów czy mięśni. Pomagają także w łagodzeniu zapalenia górnych dróg oddechowych, szczególnie gdy towarzyszy mu suchy, uciążliwy kaszel.

Wskazania

Wskazania do stosowania:

- Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką.
- Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, mięśni, stawów, ból neuropatyczny i inne.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy i kodeiny fosforan.
- 1 tabletka zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 8 mg kodeiny.
- Pozostałe składniki leku to: glicyna i skrobia ryżowa.

Stosowanie

Stosowanie u dorosłych:

- Jednorazowo od 1 do 2 tabletek

Stosowanie u młodzieży w wieku powyżej 12 lat:

- Lek można stosować u młodzieży powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza; od 1 do 2 tabletek

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ascodan:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;
- jeśli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami, takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs;
- jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, katar sienny lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczyń ruchomy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;
- jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);
- jeśli pacjent ma depresję oddechową (spłycenie i zwolnienie oddychania);
- jeśli pacjent jest w stanie ostrego upojenia alkoholowego;
- jeśli u pacjenta występuje ryzyko porażenia niedrożności jelit (częściowe lub całkowite zatrzymanie przechodzenia treści pokarmowej przez jelita);
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
- jeśli wiadomo, że u pacjenta metabolizm kodeiny do morfiny przebiega bardzo szybko;
- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);
- jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);
- jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;
- jednocześnie z inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu;
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat;
- u dzieci i młodzieży (w wieku 0 do 18 lat) do łagodzenia bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych lub gardłowych w związku z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego;
- jeśli pacjent ma uraz głowy lub krwotok wewnętrzny;
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Producent

POLPHARMA