

Aspargin, 50 tabletek



Cena: 9,35 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM
Przeznaczenie	Niedobór minerałów
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aspargin to produkt leczniczy zawierający magnez i potas w postaci łatwo przyswajalnych soli kwasu asparaginowego.

Wskazania

Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu w organizmie (gdy nie jest konieczne podawanie drogą dożylną):

- w zaburzeniach pracy serca spowodowanych niedoborem magnezu i potasu,
- profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca i w zagrożeniu zawałem,
- w rekonwalescencji pozawałowej,
- po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, które spowodowały zmniejszenie stężenia magnezu i potasu,
- jako lek przeciwdziałający niepożądanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosedmidu).

Działanie

- Magnez uczestniczy w działaniu enzymów regulujących przemianę węglowodanów, białek i tłuszczów, oraz w procesach wytwarzania i magazynowania energii.
- Potas wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego oraz aktywność mięśnia sercowego.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-3 tabletki dwa razy na dobę.

Skład

Substancjami czynnymi są magnezu wodorooasparaginian (Magnesii hydroaspartas) oraz potasu wodorooasparaginian (Kalii hydroaspartas).

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, ultraamylopektyna, magnezu stearynian, talk.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aspargin:

- nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- nadmiar magnezu lub potasu we krwi,
- ciężka niewydolność nerek,
- zakażenie dróg moczowych,
- zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca),
- znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

Działania niepożądane

- zaburzenia pracy serca,
- osłabienie mięśniowe,
- zaczerwienienie skóry.

Ostrzeżenia

- Lek należy ostrożnie stosować u osób leczonych glikozydami nascerowymi lub innymi lekami zawierającymi potas.
- Lek zawiera cukier.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu jednostkowym w celu ochrony przed wilgocią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczny Farmopol Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29
61-749 Poznań