

Aspargin, 50 tabletek

Cena: 7,22 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ASPARGIN
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY "FARMAPOL" SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Niedobór minerałów
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Aspargin to produkt leczniczy zawierający magnez i potas w postaci łatwo przyswajalnych soli kwasu asparaginowego.

Wskazania

Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu w organizmie (gdy nie jest konieczne podawanie drogą dożylną):

- w zaburzeniach pracy serca spowodowanych niedoborem magnezu i potasu,
- profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca i w zagrożeniu zawałem,
- w rekonwalescencji pozawałowej,
- po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, które spowodowały zmniejszenie stężenia magnezu i potasu,
- jako lek przeciwdziałający niepożądanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosedmidu).

Działanie

Lek dostarcza jony magnezu i potasu uzupełniając tym samym niedobory tych pierwiastków w organizmie.

Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, pośredniczy w wytwarzaniu i transporcie energii w organizmie. Jest niezbędny w czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych

Potas uczestniczy w czynności układu nerwowego i układu sercowo - naczyniowego oraz w przewodnictwie nerwowo-mięśniowym

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-3 tabletki dwa razy na dobę.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: 17 mg jonów magnezu w postaci 250 mg magnezu wodorooasparaginyanu czterowodnego (Magnesii hydroaspartas) i 54 mg jonów potasu w postaci 250 mg potasu wodorooasparaginyanu półwodnego (Kalii hydroaspartas).
- substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aspargin:

- nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- nadmiar magnezu lub potasu we krwi,
- ciężka niewydolność nerek,
- zakażenie dróg moczowych,
- zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca),
- znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

Działania niepożądane

- zaburzenia pracy serca,
- osłabienie mięśniowe,
- zaczerwienienie skóry.

Ostrzeżenia

- Lek należy ostrożnie stosować u osób leczonych glikozydami nascerowymi lub innymi lekami zawierającymi potas.
- Lek zawiera cukier.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu jednostkowym w celu ochrony przed wilgocią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczny Farmopol Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29
61-749 Poznań