

Aspirin C 400 mg + 240 mg, tabletki musujące, (import równoległy), 10 sztuk

Cena: 17,51 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki musujące
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Aspirin C to lek w formie tabletek musujących, łączący działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Dodatek witaminy C wspiera układ odpornościowy. Musująca forma leku na przeziębienie i grypę przyspiesza jego wchłanianie.

Wskazania

Aspirin C stosuje się w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu oraz w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy

Działanie

Lek Aspirin C działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Witamina C dodatkowo wzmacnia system odpornościowy organizmu.

Dawkowanie

- Dorośli: od 1 do 2 tabletek musujących.
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza: 1 tabletkę.

Skład

- Substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).
- Substancje pomocnicze: sodu cytrynian bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aspirin C:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,
- jeśli u pacjenta występuje ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca,
- jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
- u dzieci poniżej 12 roku życia.

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- bóle żołądka i brzucha,
- zgaga,
- nudności i wymioty,
- niestawność,
- zawroty głowy i szumy uszne,
- zwiększone ryzyko krwawień,
- łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę,
- wysypka, pokrzywka.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania Aspirin C należy omówić z lekarzem jeśli u pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, występuje zaburzona czynność wątroby, jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa.
- Lek Aspirin C zawiera sód, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
- Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy i inne reakcje nadwrażliwości.
- Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin C.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

INPHARM/BAYER