

Aspirin C Forte Tabletki musujące 10 tabletek

Cena: 34,66 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki musujące
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból, Gorączka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aspirin C Forte, opracowany przez firmę Bayer, jest dostępny w postaci tabletek musujących i ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Zapewnia podwójną siłę w łagodzeniu objawów związanych z przeziębieniem i grypą, takich jak gorączka, ból głowy i ból gardła. W porównaniu do Aspirin® C preparat ten zawiera podwójną dawkę kwasu acetylosalicylowego oraz witaminy C.

Podstawowym wskazaniem do stosowania Aspirin® C Forte firmy Bayer jest leczenie objawowe bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, w tym bólów głowy, zębów i mięśni. Dodatkowo można go przyjmować w celu złagodzenia bólu i gorączki związanej z objawami przeziębienia i grypy. Dodatkowa zawartość witaminy C dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy organizmu.

Wskazania

- gorączki lub bólu o małym bądź umiarkowanym nasileniu, w tym bólu głowy, bólów mięśni i bólów zębów,
- dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie,
- stanów zapalnych.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Dorośli: jednorazowo 1 tabletkę musującą.
- W razie konieczności dawkę jednorazową można powtarzać, co 4 do 8 godzin.
- Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki musujące na dobę.
- Lek do podawania doustnego; tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.
- Przyjmować po posiłkach.

Leku nie należy stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład

1 tabletkę musująca zawiera:

- substancje czynne: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) 800 mg i witamina C (Acidum ascorbicum 480 mg),
- pozostałe składniki: sodu wodorowęglan (modyfikowany): sodu wodorowęglan i sodu węglan kwas cytrynowy bezwodny, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na właściwości, inne salicylany lub dodatek składnika preparatu.
- Skaza krwotoczna.
- Ostre choroby wrzodowe żołądka lub dwunastnicy.
- Ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność nerek.
- Wystąpienie napadów astmy oskrzelowej w przeszłości, wywołanych podaniem salicylanów lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- Jednoczesnego uniwersalnego leku metotreksat w wysokości 15 mg tydzień na lub rozszerzenie. Ponadto Aspirin® C Forte nie powinien być ostatni raz w trymestrze ciąży oraz u dzieci i młodzieży.

Działania niepożądane

Aspirin® C Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdego pacjenta. W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, ciężka reakcja nadwrażliwości, bóle żołądka, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia czynności nerek, reakcje alergiczne, astma oskrzelowa itp., należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Ponadto, leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), do których należy Aspirin® C Forte, może wiązać się z ryzykiem wystąpienia obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Działania niepożądane mogą również obejmować bóle żołądka i brzucha, zgagę, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, krwawienia, zmiany w wynikach badań laboratoryjnych, zawroty głowy, szumy uszne, wydłużenie czasu krwawienia, niedokrwistość, krwawienia do mózgu, zaburzenia czynności nerek, reakcje alergiczne, astmę oskrzelową itp.

Interakcje

Dokładnie, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aspirin® C Forte należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich innych lekach, które pacjent aktualnie przyjmuje lub przyjmował ostatnio, a także o planowanych lekach. Istnieje kilka leków, z którymi należy omówić przyjmowanie Aspirin® C Forte ze względu na potencjalne interakcje i ryzyko działań niepożądanych. Są to:

- Metotreksat stosowany w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień: Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ Aspirin® C Forte może mieć działanie toksyczne na szpik kostny w połączeniu z metotreksatem.
- Leki przeciwzakrzepowe (np. pochodne kumaryny, heparyna), leki trombolityczne oraz leki hamujące zlepianie płytek krwi (np. tyklopidyna): Istnieje zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków przy jednoczesnym stosowaniu tych leków z Aspirin® C Forte.
- Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inne salicylany w dużych dawkach: Istnieje ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek przy jednoczesnym stosowaniu tych leków z Aspirin® C Forte.
- Glikokortykosteroidy stosowane ogólnie (z wyjątkiem hydrokortyzonu): Istnieje ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego, a także zmniejszenia stężenia salicylanów w osoczu podczas leczenia glikokortykosteroidami i zwiększenia ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu stosowania glikokortykosteroidów.
- Digoksyna (lek stosowany w chorobach serca): Kwas acetylosalicylowy zwiększa stężenie digoksyny we krwi, dlatego należy omówić przyjmowanie Aspirin® C Forte z lekarzem.
- Leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonilomocznika: Konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ Aspirin® C Forte może wpływać na kontrolę poziomu cukru we krwi.

Ostrzeżenia

- Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na ilość substancji czynnych zawartych w jednej tabletkę musującej.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, alergicznych reakcji na inne substancje, jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, zaburzeń czynności wątroby, nerek lub krążenia, choroby wrzodowej lub krwawień z przewodu pokarmowego, choroby genetycznej polegającej na niedoborze enzymu dehydrogenazy

glukozy-6-fosforanowej lub w przypadku karmienia piersią.

- Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości, dlatego szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarciem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz u pacjentów, u których występują reakcje alergiczne.
- Pacjenci przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi powinni poinformować lekarza, chirurga, anestezjologa lub dentystę o przyjmowaniu leku.
- Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych, w tym zawierających kwas acetylosalicylowy, może prowadzić do zaburzeń czynności nerek i niewydolności nerek.
- U pacjentów z infekcjami wirusowymi, takimi jak grypa typu A, grypa typu B lub ospa wietrzna, szczególnie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a, dlatego należy zachować ostrożność.
- Lek zawiera sod, dlatego pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami czynności nerek i kontrolujący zawartość sodu w diecie powinni być ostrożni.
- Przyjmowanie leku Aspirin® C Forte w ostatnim trymestrze ciąży może powodować powikłania zarówno u matki, jak i u noworodka.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

