

Aspirin Cardio, 100 mg, tabletki powlekane, 56 tabletek

Cena: 19,52 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	56 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwzakrzepowe, Rozrzedzające krew
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aspirin Cardio to lek stosowany w profilaktyce zakrzepów. Zawiera kwas acetylosalicylowy, który w niskich dawkach, przy długotrwałym stosowaniu, hamuje agregację płytek krwi, zmniejszając ryzyko powstawania zakrzepów.

Wskazania

Lek Aspirin Cardio jest wskazany do stosowania u dorosłych w następujących chorobach układu sercowo-naczyniowego: w niestabilnej chorobie wieńcowej; w świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca; w zapobieganiu powtórному zawałowi serca; w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylny); w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA; w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka; w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

Działanie

Działanie leku Aspirin Cardio wynika z obecności kwasu salicylowego, który przyjmowany przez długi czas w małych dawkach hamuje zlepianie (agregację) płytek krwi, co zapobiega tworzeniu się zakrzepów.

Dawkowanie

- Niestabilna choroba wieńcowa: 1 tabletkę powlekana raz dziennie.
- Świeży zawał serca lub jego podejrzenie: 2 do 3 tabletek powlekanych raz dziennie, ważne, aby były one rozkruszone co przyspieszy wchłanianie.
- Profilaktyka wystąpienia powtórного zawału serca: 1 tabletkę powlekana raz dziennie.
- Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylny: 1 tabletkę powlekana raz dziennie.

- Zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA: 1 tabletkę powlekana raz dziennie.
- Zapobieganie pierwszemu zawałowi serca z wieloma czynnikami ryzyka: 1 tabletkę powlekana raz dziennie.
- Zapobieganie zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki: 1 lub 2 tabletki powlekane raz dziennie.

Skład

- Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).
- Jedna tabletkę powlekana zawiera jako substancję czynną 100 mg (Acidum acetylsalicylicum) kwasu acetylosalicylowego (ASA).
- Substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylan metylu, polisorbit 80, sodu laurylosiarczan, talk, cytrynian trietylu.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Aspirin Cardio: jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku; jeśli pacjent przyjmuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność serca; jeśli w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a – rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Działania niepożądane

- Dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi. W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz.
- Reakcje nadwrażliwości, np. w postaci odczynów skórnych, pokrzywki, wysypki, świądu, zaburzeń sercowo-oddechowych, napadów astmy, obrzęków, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa.
- Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, są zazwyczaj objawami przedawkowania.
- Ze względu na wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi w czasie stosowania leku Aspirin Cardio zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego; może także wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi. Obserwowano krwawienia takie jak: krwotok okołoperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko odnotowano poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (zmęczenie), bledność, hipoperfuzja (zmniejszony przepływ krwi).

Ostrzeżenia

- Należy ostrożnie stosować tabletki powlekane Aspirin Cardio w przypadku: I i II trymestru ciąży oraz w czasie laktacji, nadwrażliwości na NLPZ oraz leki przeciwreumatyczne, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub układu krążenia, wątroby a także u osób, u których wcześniej występowała choroba wrzodowa albo krwawienie z przewodu pokarmowego.
- Lek może powodować skurcz oskrzeli oraz napady astmy czy inne reakcje alergiczne, zwłaszcza w przypadku pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz wykazujący reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje. Kwas acetylosalicylowy zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu, co może wywołać napad dny moczowej u osób ze skłonnością do niej.
- Należy poinformować lekarza przed zabiegami chirurgicznymi, w tym też dentyścycznymi, o stosowaniu leku Aspirin Cardio.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

BAYER