

Aspirin Pro, 500 mg, tabletki powlekane, 8 tabletek

Cena: 9,43 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	8 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

ASPIRIN PRO to lek zawierający kwas acetylosalicylowy, wykazujący działanie łagodzące ból oraz obniżające gorączkę.

Wskazania

Lek Aspirin Pro stosuje się w objawowym leczeniu gorączki i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu, np. ból głowy, dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie, bóle zębów, bóle mięśni.

Działanie

Lek Aspirin Pro zawiera kwas acetylosalicylowy. Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia: jednorazowo 1 tabletkę. W razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. W przypadku bardziej nasilonej gorączki lub bólu zalecana pojedyncza dawka wynosi 2 tabletki, w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin.
- Młodzież w wieku 12-15 lat (u osób o masie ciała 40-50 kg): jednorazowo 1 tabletkę, w razie potrzeby dawkę taką można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin.

Skład

- Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).
- 1 tabletkę zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.
- Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna, sodu węglan bezwodny; otoczka: wosk Carnauba, hypromeloza, cynku stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aspirin Pro:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej lub reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) wywołane podaniem kwasu acetylosalicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
- jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
- jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna lub jeśli występuje podwyższone ryzyko krwawienia;
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek, wątroby lub serca;
- jeśli pacjent jest leczony metotreksatem w dawkach większych niż 20 mg na tydzień;
- jeśli pacjent jest leczony doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (leki rozrzedzające krew i zapobiegające jej krzepnięciu);
- jeśli pacjentka jest po piątym miesiącu ciąży (ponad 24 tygodnie bez miesiączki).

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- krwawienie z nosa, dziąseł,
- bóle głowy, zawroty,
- bóle brzucha,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych,
- pokrzywka, reakcje skórne.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania Aspirin Pro należy poradzić się lekarza jeśli pacjent jest leczony innymi lekami zawierającymi kwas acetylosalicylowy, jeśli pacjent regularnie stosuje leki przeciwbólowe, jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
- Aspirin C zawiera sól.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.
- Lek Aspirin C należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

BAYER SP. Z O.O.
Aleje Jerozolimskie 158
Warszawa