

Aviorexan, 50 mg + 50 mg, tabletki powlekane, 10 tabletek

Cena: 28,29 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne, Przeciwwymiotne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Aviorexan to lek stosowany w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej, a także w leczeniu nudności i wymiotów z innych przyczyn. Zawiera dwie substancje aktywne – dimenhydraminę i kofeinę. Dimenhydramina redukuje objawy choroby lokomocyjnej, a kofeina łagodzi jej uspokajające działanie.

Wskazania

Lek stosuje się w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów innego pochodzenia.

Działanie

- Dimenhydramina działa przeciwwymiotnie, przeciwuczuleniowo i łagodnie uspokajająco. Początek działania występuje po 20 do 30 minutach i obserwuje się go przez 4 do 6 godzin po podaniu leku.
- Kofeina łagodzi działanie sedacyjne dimenhydraminy.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: Zalecana dawka wynosi 1-2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę. W profilaktyce objawów choroby lokomocyjnej pierwszą dawkę należy zażyć nie później niż 30 minut przed planowaną podróżą.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są dimenhydramina i kofeina.
- Każda tabletki powlekana zawiera 50 mg dimenhydraminy (Dimenhydrinatum) i 50 mg kofeiny (Coffeinum).
- Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna; krospowidon Typ A; powidon K 29/32; krzemionka koloidalna bezwodna; magnezu stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza; tytanu dwutlenek (E 171); makrogol 6000; talk.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku; porfirii; ostry ataku astmy; ciężkiego zaburzenia sercowo-naczyniowego; niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego; bezsenności i stanów lękowych; padaczki; wrzodów żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężkiego zaburzenia wątroby; jaskry z wąskim kątem przesączania; guz chromochłonny nadnerczy.

Działania niepożądane

Działania niepożądane związane ze stosowaniem dimenhydraminy:

- Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób): niedokrwistość, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek tj. białych, czerwonych i płytek krwi), agranulocytoza (znaczące zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów lub brak granulocytów we krwi).
- Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób): paradoksalne pobudzenie (szczególnie u dzieci mogą wystąpić reakcje paradoksalne, takie jak bezsenność, nerwowość, zmieszanie, drgawki, drażliwość, euforia, delirium, kołatanie serca i drgawki), tachykardia (przyspieszone bicie serca), zaburzenia rytmu serca (m.in. esktrasystolie – dodatkowe skurcze serca, blok serca), zwiększenie ciśnienia tętniczego, obniżenie ciśnienia tętniczego, nasilenie wydzielania wydzieliny oskrzelowej mogące prowadzić do trudności w oddychaniu.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne, zmniejszenie apetytu, pobudzenie, zaburzenia snu, niepokój, drżenie, senność, uspokojenie (sedacja), zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia widzenia, zwiększenie ciśnienia w oku, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból brzucha, suchość w ustach, skórne reakcje alergiczne, nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, zapalenie skóry, świąd, wysypka, rumień, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia funkcji seksualnych, nasilenie porfirii, uczucie zmęczenia.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem kofeiny:

- Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): bezsenność, pobudzenie, zwiększenie ciśnienia tętniczego, obniżenie ciśnienia tętniczego.
- Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób): zmniejszenie poziomu glukozy we krwi, zwiększenie poziomu glukozy we krwi, niepokój (stosowanie dużych dawek może powodować nerwicę i lęk), drażliwość, bóle głowy, szumy uszne, uderzenia gorąca, tachykardia (przyspieszone bicie serca), zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca (nieprzyjemne uczucie nieregularnego i (lub) mocnego bicia serca), przyspieszona częstość oddechów, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, częstomocz (konieczność oddawania moczu częściej niż zwykle).

Ostrzeżenia

Podczas stosowania leku należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z: nadwrażliwością na leki stosowane w łagodzeniu alergii (leki przeciwhistaminowe) lub leki z grupy pochodnych ksantyny (m.in. teofilina i aminofilina stosowane w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc); rozrostem gruczołu krokowego; trudnościami w oddawaniu moczu; zwięzającym wrzodem trawiennym lub zwężeniem odźwiernika; nadczynnością tarczycy; jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; chorobami oskrzeli i (lub) płuc: przewlekłym zapaleniem oskrzeli, astmą oskrzelową, obturacyjną chorobą płuc, rozedmą płuc; zaburzeniami rytmu serca; chorobą niedokrwinną serca; cukrzycą.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań