

Axoprofen Forte 400 mg, 20 tabletek powlekanych

Cena: 14,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ARISTO PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Axoprofen Forte to lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), który działa poprzez łagodzenie bólu, redukcję stanu zapalnego oraz obniżanie gorączki.

Wskazania

- Axoprofen Forte 400 mg to lek dla osób dorosłych i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej).
- Lek wskazany jest do stosowania w krótkotrwałym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i (lub) gorączki.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Pacjenci dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej): połowę tabletki (200 mg), lub jedną całą tabletkę, podawane w dawce pojedynczej, należy popić szklanką wody.

Skład

1 tabletkę powlekana zawiera:

- substancja czynna: ibuprofen 400 mg,
- rdzeń tabletki: hypromeloza, kroscarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan i magnezu stearynian,
- otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, glikol propylenowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Axoprofen Forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawy reakcji nadwrażliwości

- mogą obejmować: obrzęk powiek, warg, języka lub gardła,
- jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja nadwrażliwości po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ), taka jak: skurcz oskrzeli (zaciśnięcie mięśni w płucach powodujące duszność), astma, katar, swędzący nos i stan zapalny nosa z kichaniem, pokrzywka (swędząca wysypka) lub obrzęk naczynioruchowy (obrzęk pod skórą),
 - jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia wytwarzania niektórych składników krwi,
 - jeśli u pacjenta występuje lub występowała nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzody trawienne) lub krwawienie (co najmniej dwa różne epizody potwierdzonych owrzodzeń lub krwawień),
 - jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
 - jeśli u pacjenta występuje krwawienie do mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne aktywne krwawienie,
 - jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,
 - jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (np. z powodu wymiotów, biegunki lub niewystarczającego przyjmowania płynów),
 - jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

Często (występują u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- objawy dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, niestrawność oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w pojedynczych przypadkach mogą prowadzić do niedoboru czerwonych ciałek krwi (anemii).

Niezbyt często (występują u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

- zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, nadmierne pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie,
- zaburzenia widzenia. W tym przypadku należy przerwać stosowanie ibuprofenu i skontaktować się z lekarzem,
- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzody trawienne), czasami z krwawieniem i perforacją (ubytki w ścianie przewodu pokarmowego), czasami zakończone zgonem, mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie linii warg z owrzodzeniem), zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie jelita grubego),

zapalenie błony śluzowej żołądka,

- reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka skórna i świąd oraz napady astmy (z możliwym towarzyszącym nagłym zmniejszeniem ciśnienia krwi).

Rzadko (występują u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

- szumy uszne (dzwonienie w uszach),
- utrata słuchu,
- uszkodzenia tkanki nerek (martwica brodawek nerkowych), podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi, podwyższone stężenie mocznika we krwi.

Producent

Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Str. 8-10
13435 Berlin
Niemcy