

# Azel-Drop Alergia, 0,5 mg/ml, krople do oczu, 6 ml, butelka

Cena: 51,42 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                   |
| Opakowanie      | 6 ml (but.)                                             |
| Postać          | Krople do oczu                                          |
| Producent       | BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.                              |
| Przeznaczenie   | Przeciwalergiczne                                       |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                         |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

**Azel-Drop Alergia** to krople do oczu z chlorowodorkiem azelastyny, stosowane w zapobieganiu i leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia. Dodatkowo, są one używane w leczeniu objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

### Wskazania

Krople do oczu Azel-Drop Alergia wskazane są w leczeniu i profilaktyce objawów alergicznego, sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku poniżej 4 lat oraz w leczeniu objawów niesezonowego (całorocznego), alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

### Działanie

Azelastyna, która jest substancją czynną Azel-Drop Alergia działa przeciwalergicznie i miejscowo przeciwzapalnie.

### Dawkowanie

Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek

- U dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej najczęściej podaje się jedną kroplę do każdego oka dwa razy na dobę. W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli, podawanej 4 razy dziennie. Produkt Azel-Drop Alergia można podawać profilaktycznie przed przewidywanym narażeniem na alergen.

Niesezonowe (całoroczne) alergiczne zapalenie spojówek

- U dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej zazwyczaj podaje się jedną kroplę do każdego oka, dwa razy na dobę. W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli podawanej 4 razy dziennie. W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu podczas leczenia trwającego maksymalnie 6 tygodni, dlatego jeden cykl leczenia należy ograniczyć do 6 tygodni.

#### Uwaga dotycząca samoleczenia:

- Leczenie sezonowego zapalenia spojówek przez okres dłuższy niż 6 tygodni powinno odbywać się wyłącznie pod kontrolą lekarską. Zaleca się kontakt z lekarzem, jeśli nastąpi nasilenie objawów choroby lub w ciągu 48 godzin nie nastąpi poprawa stanu zdrowia pacjenta.

#### Skład

- Substancją czynną jest azelastyna.
- Jeden ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg azelastyny chlorowodoru.
- Jedna kropla zawiera 0,015 mg azelastyny chlorowodoru.
- Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sorbitol 70% ciekły, (niekrystalizujący), hypromeloza, disodu edetynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

#### Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Azel-Drop Alergia w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik produktu.

#### Działania niepożądane

- Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100): łagodne, przemijające podrażnienie (np. pieczenie, swędzenie, łzawienie)
- Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000): gorzki smak w ustach.
- Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): reakcje alergiczne (takie jak wysypka i świąd).

#### Ostrzeżenia

- Produkt leczniczy Azel-Drop Alergia nie jest przeznaczony do leczenia zakażenia oczu.
- Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Preparat zawiera 0,0035 mg chlorku benzalkoniowego w każdej kropli, co odpowiada stężeniu 0,125 mg/ml.
- Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka, może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Należy stosować go ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka i u pacjentów u których rogówka może być zagrożona.
- Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C, w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
- Nie stosować leku po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

#### Producent

Bausch Health Ireland Limited  
Lake Drive Citywest Business  
3013 Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia