

Azelastin COMOD krople do oczu



Cena: 42,91 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	AZELASTIN COMOD
Opakowanie	1 pojemnik
Postać	Krople do oczu
Producent	URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Azelastin COMOD to lek przeznaczony do leczenia dolegliwości oczu wynikających z kataru siennego, czyli alergicznego zapalenia spojówek.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka objawów alergicznego sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej. Leczenie objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

Działanie

Lek Azelastin COMOD zawiera azelastynę, która należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Działanie leków przeciwhistaminowych polega na hamowaniu działania substancji takich jak histamina, która wytwarzana jest przez organizm podczas reakcji alergicznej. Wykazano, że azelastyna łagodzi stan zapalny oczu

Dawkowanie

- Zaburzenia oczu spowodowane przez katar sienny (sezonowe alergiczne zapalenie spojówek)

Dorośli i dzieci w wieku 4 lat i powyżej: 1 kropla do każdego oka rano i wieczorem.

- Alergiczne zaburzenia oka (całoroczne/niesezoneowe zapalenie spojówek):

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 1 kropla do każdego oka rano i wieczorem.

Skład



0,05% roztwór chlorowodoru azelastyny (0,50mg/ml).

Jedna kropla leku o objętości około 30µl zawiera 0,015mg chlorowodoru azelastyny (Azelastini hydrochloridum). Skład pomocniczy: disodu edetynian, hypromeloza, sorbitol, sodu wodorotlenek (do korekty pH), woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Azelastin COMOD:

- w przypadku uczulenia na chlorowodorek azelastyny lub na którykolwiek ze składników tego leku.

Działania niepożądane

- Niewielkie podrażnienie oczu (pieczenie, świąd, łzawienie).

Ostrzeżenia

- Lek nie nadaje się do leczenia zakażeń oczu.
- Zastosowanie leku należy omówić z lekarzem jeśli: dolegliwości oka mogą nie być spowodowane alergią, obejmują tylko 1 oko, występuje upośledzenie wzroku, bolesność oka, pacjent nie odczuwa dolegliwości ze strony oka; jeśli dolegliwości nasilają się lub trwają ponad 48 godzin bez wyraźnej poprawy; jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe.
- Przechowywać w sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Produkt jest ważny 12 tygodni po pierwszym użyciu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

URSAPHARM POLAND
Małarska 6
Łomianki