


Azelastin POS, 1 mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 59,37 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	AZELASTIN POS
Opakowanie	1 pojemnik po 10 ml
Postać	Aerozol
Producent	URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Azelastin POS to lek stosowany w leczeniu kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa).

Wskazania

Objawowe leczenie sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Działanie

Azelastin POS wykazuje działanie przeciwalergiczne. Lek hamuje działanie histaminy.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Skład

- Substancją czynną jest: azelastyny chlorowodorek.
- 1 naciśnięcie pompki dozującej dostarcza 0,14 ml roztworu, który zawiera 0,14 mg azelastyny chlorowodoru.
- Substancje pomocnicze: hypromeloza, disodu edetynian, kwas cytrynowy bezwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Azelastin POS:

- w przypadku uczulenia na azelastynę lub na którykolwiek ze składników tego leku,
- u osób poniżej 6 roku życia.



Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- nieprzyjemny smak w ustach (może być związany z nieprawidłową techniką rozpylania).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- dyskomfort w obszarze nosa (pieczenie, świąd), kichanie, krwawienie z nosa.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- nudności.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- uczucie zmęczenia (znużenie, wyczerpanie),
- zawroty głowy lub osłabienie,
- reakcje nadwrażliwości,
- wysypka, świąd, pokrzywka.

Ostrzeżenia

- Azelastin POS nie jest odpowiedni do leczenia przeziębienia ani grypy.
- Jeśli po zastosowaniu leku pojawi się gorzki smak w ustach, można go zneutralizować za pomocą napoju bezalkoholowego (np. soku, mleka).
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Nie stosować dłużej niż przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Producent

URSAPHARM POLAND
Małarska 6
Łomianki