

Bebiko Pro+ 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 700 g



Cena: 70,35 zł

Opis słownikowy

| | |
|------------|----------------------------|
| Opakowanie | 700 g |
| Postać | prosz. |
| Producent | NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. |

Opis produktu

Wskazania

Lactofidus proces fermentacji mlekowej, DHA*, nasza unikalna receptura, kompletna odżywcza formuła, bez oleju palmowego, także do dokarmiania, * zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt), Zgodnie z przepisami prawa, tak jak wszystkie mleka początkowe

Składniki

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktooligosacharydy z mleka (9,0 %), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, olej słonecznikowy, białka mleka, fruktooligosacharydy (0,6 %), olej rybi, wapń, olej z Mortierella alpina, chlorek choliny, potas, sól, magnez, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, L-tryptofan, żelazo, L-karnityna, cynk, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, selen, mangan, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12

Wartości odżywcze

Wartość energetyczna
Tłuszcz w tym
kwasy tłuszczowe nasycone
kwasy tłuszczowe jednonienasycone
kwasy tłuszczowe wielonienasycone
kwas linolowy (LA)
kwas α-linolenowy (ALA)
kwas arachidonowy (ARA)
kwas dokozaheksaenowy (DHA)
kwas eikozapentaenowy (EPA)

Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka
276/66 kJ/kcal
3,4 g
1,1 g
1,7 g
0,6 g
455 mg
54,5 mg
16,5 mg
16,5 mg
3,6 mg

| | Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka |
|----------------------|--|
| Węglowodany w tym | 7,3 g |
| cukry | 7,2 g |
| laktoza | 7,0 g |
| Błonnik w tym | 0,6 g |
| GOS* | 0,48 g |
| FOS** | 0,08 g |
| Białko | 1,3 g |
| L-karnityna | 2,1 mg |
| Witaminy: | |
| Witamina A | 58 µg |
| Witamina D | 1,45 µg |
| Witamina E | 1,4 mg |
| Witamina K | 5,1 µg |
| Witamina C | 9,2 mg |
| Tiamina | 0,06 mg |
| Ryboflawina | 0,13 mg |
| Niacyna | 0,43 mg |
| Witamina B6 | 0,047 mg |
| Kwas foliowy | 7,4 µg |
| Witamina B12 | 0,16 µg |
| Biotyna | 1,7 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,53 mg |
| Składniki mineralne: | |
| Sód | 21,6 mg |
| Potas | 71 mg |
| Chlorek | 52 mg |
| Wapń | 62 mg |
| Fosfor | 42 mg |
| Magnez | 5,4 mg |
| Żelazo | 0,53 mg |
| Cynk | 0,48 mg |
| Miedź | 0,052 mg |
| Mangan | 0,003 mg |
| Fluorek | ≤0,006 mg |
| Selen | 3,0 µg |
| Jod | 13 µg |
| Inne: | |
| Inozytol | 7,2 mg |
| Cholina | 21 mg |
| Pozostałe GOS* | 0,2 mg |

* Galaktooligosacharydy; ** Fruktooligosacharydy

Jedno opakowanie pozwala na przygotowanie około 50 butelek mleka o pojemności 100 ml.

Stosowanie

Tabela żywienia

Bebiko Pro+ 1 mleko początkowe w proszku

Należy stosować się do tabeli żywienia. Podano w niej przeciętną wielkość i liczbę posiłków spożywanych przez niemowlę w ciągu doby.

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Wiek niemowlęcia 1. miesiąc / Liczba porcji na dobę 7 / Woda (ml) 90 - 120 / Liczba płaskich miareczek na porcję 3-4

Wiek niemowlęcia 2.-3. miesiąc / Liczba porcji na dobę 6 / Woda (ml) 120 / Liczba płaskich miareczek na porcję 4

Wiek niemowlęcia 4. miesiąc / Liczba porcji na dobę 6 / Woda (ml) 150 / Liczba płaskich miareczek na porcję 5

Wiek niemowlęcia 5.-6. miesiąc / Liczba porcji na dobę 4 / Woda (ml) 180 / Liczba płaskich miareczek na porcję 6

100 ml Bebiko Pro+ 1 = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki. 1 płaska miareczka = 4,6 g

Bebiko Pro+ 1 może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita, na odpowiednim etapie rozszerzania diety niemowlęcia. Decyzja o rozpoczęciu rozszerzania diety powinna być skonsultowana z lekarzem.

Instrukcja karmienia dziecka

- Bebiko Pro+ 1 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu
- Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku
- Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka
- Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem

Ważne informacje

Bebiko Pro+ 1, tak jak inne mleka początkowe, powinno być stosowane po zasięgnięciu porady lekarza. Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia nie następowała gwałtownie. Przejście z karmienia mlekiem Bebiko Pro+ 1 na Bebiko Pro+ 2 należy przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebiko Pro+ 1 i zwiększając ilość proszku Bebiko Pro+ 2.

Sposób przygotowania mleka

1. Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
2. Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.
3. Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.
4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Dodaj dokładną liczbę płaskich, nieubitych miareczek Bebiko Pro+ 1. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
6. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 sekund do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.
7. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Ważne informacje!

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, w przypadku gdy nie są karmione piersią. Bebiko Pro+ 1 może być używane w sytuacji, gdy dziecko jest karmione piersią, a istnieje konieczność dokarmiania. Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, Bebiko Pro+ 1 tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Przechowywanie

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu:

- Produkt w puszcze fabrycznie zamkniętej jak i po jej otwarciu przechowywać w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce.
- Po pierwszym otwarciu puszek, zawartość zużyć w ciągu 1 miesiąca.
- Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników.
- Po każdym użyciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą.
- Puszczę wyrzucić dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na niej ważne informacje.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenie: Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Producent

Nutricia Polska Sp. z o.o.

Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakowania

700

Opis

Bebiko Pro+ 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 700 g