

Bebilon Profutura CESARBIOTIK 1, mleko początkowe od urodzenia, proszek, 800 g



Cena: 151,48 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	BEBILON
Opakowanie	800 g
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odżywcze
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka

Opis produktu

Opis

Bebilon PROfutura CESARBIOTIK 1 to mleko początkowe od urodzenia, specjalnie opracowane dla dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie. Jego kompletny skład odżywczy zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe niemowląt, które nie są karmione piersią, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Może być jedynym pokarmem do wprowadzenia żywienia uzupełniającego lub stanowić uzupełnienie karmienia piersią, jeśli jest to konieczne. Produkt zawiera DHA, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

Dawkowanie

- Niemowlę do 1 miesiąca życia: 3-4 miarki proszku rozpuszczone w 90-120 ml wody do 7 razy dziennie.
- Niemowlę w 2 i 3 miesiącu życia: 4 miarki proszku rozpuszczone w 120 ml wody do 6 razy dziennie.
- Niemowlę w 4 miesiącu życia: 5 miarek proszku rozpuszczonych w 150 ml wody do 6 razy dziennie.
- Niemowlę w 5 i 6 miesiącu życia: 6 miarek proszku rozpuszczonych w 180 ml wody do 4 razy dziennie.

Skład

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,92%), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, olej słonecznikowy, białka mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,61 %), olej rybi, wapń, potas, olej z Mortierella alpina, sól, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,19%), chlorek choline, magnez, witamina C, emulgator (lecycytyny z soi), tauryna, inozytol, Bifidobacterium breve M-16V, żelazo, cynk, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydino-5'-monofosforowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas adenozylo-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozylo-5'-fosforowego, L-karnityna, niacyna, kwas pantotenowy, sól sodowa kwasu guanozylo-5'-fosforowego, miedź, witamina E, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Sposób użycia

- Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
- Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu w celu odmierzenia odpowiedniej ilości wody.
- Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
- Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Babilon Profutura CESARBIOTIK. W tym celu używaj wyłącznie załączonej miareczki, przestrzegając wartości zamieszczonych w tabeli żywienia.
- Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.
- Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
- Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.
- Umyj butelkę i smoczek zaraz nakarmieniu dziecka.

Ostrzeżenia

- Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest przystosowany dla niemowląt od urodzenia, jeżeli z jakiegoś powodu nie mogą być one karmione piersią. Produkt nadaje się jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Aby zachować najwyższą jakość i właściwości produktu należy przechowywać produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chroniąc od źródeł światła i wilgoci. Nie przechowywać produktu w lodówce.

Produkt należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu opakowania. Nie zaleca się przesypywania preparatu do innych pojemników. Z uwagi na ważne informacje znajdujące się na oryginalnym opakowaniu, powinno być one wyrzucone wyłącznie po wykorzystaniu jego zawartości.

- Mleko Babilon Profutura CESARBIOTIK 1 należy przygotowywać zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystać w przeciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu. Zaleca się wylanie niewypitej porcji bezpośrednio po skończonym posiłku. Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej do opakowania. Nie należy dodawać dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka.
- Ważnym jest, aby po zakończonym karmieniu dopilnować, aby dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z pozostałością pokarmu. Należy również zwrócić uwagę na utrzymanie prawidłowej higieny pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.
- Nie gotować ani nie podgrzewać produktu w kuchence mikrofalowej, gdyż grozi to oparzeniem. Ponadto, podgrzewanie produktu w mikrofalówkach może prowadzić do zachwiania ilości bakterii Bifidobacterium breve M-16V w produkcie.
- Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.
- Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
- Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Producent

NUTRICIA .
Bobrowiecka 8
Warszawa