

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2, mleko następne po 6. miesiącu, proszek, 800 g



Cena: 153,42 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	BEBILON
Opakowanie	800 g
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odżywcze
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka

Opis produktu

Opis

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 to mleko następne po 6. miesiącu życia, zawierające unikalną kompozycję oligosacharydów GOS/FOS oraz składników odżywczych. Zgodnie z przepisami prawa, zawiera witaminy A, C, D, cynk, ryboflawinę, żelazo, jod, DHA i ALA. Jest odpowiednie dla niemowląt po 6. miesiącu życia, gdy karmienie piersią nie jest możliwe, oraz jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli istnieje konieczność dokarmiania.

Dawkowanie

Wiek niemowlęcia 7. miesiąc i powyżej

Liczba porcji na dobę: 3

Ilość wody na 1 porcję (ml): 210

Liczba płaskich miarek na 1 porcję: 7

Skład

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy, kokosowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, bezwodny tłuszcz mleczny, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,44%), koncentrat serwatki z mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,59%), wapń, olej rybi, białko serwatkowe z mleka, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,36%), potas, olej z Mortierella alpina, chlorek choline, sód, witamina C, magnez, emulgator (lecytyny z soi), tauryna, inozytol, żelazo, L-tryptofan, L-karnityna, cynk, nukleotydy (kwas cytydino-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydino-5'-fosforowego, kwas adenozy-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozy-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozy-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitinian L-askorbylu), witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Sposób użycia



- Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
- Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu w celu odmierzenia odpowiedniej ilości wody.
- Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
- Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon Profutura DUOBLOTIK 2. W tym celu używaj wyłącznie załączonej miareczki, przestrzegając wartości zamieszczonych w tabeli żywienia.
- Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.
- Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
- Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.
- Umyj butelkę i smoczek zaraz po zakończonym karmieniu.

Ostrzeżenia

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą. Mleko Bebilon Profutura DUOBLOTIK 2 nie może zastępować mleka matki przez pierwsze sześć miesięcy życia. Mleko Bebilon powinno być wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu. Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje. Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników. Nie należy podgrzewać mleka modyfikowanego w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem. Nigdy nie należy dodawać dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka. Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej do opakowania.

Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych zębów, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Producent

NUTRICIA .
Bobrowiecka 8
Warszawa