

Betadine, 10%, maść, 30 g

Cena: 16,13 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 g (tub.)
Postać	Maść
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antyseptyczne, Dezynfekujące, odkażające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lek **Betadine** jest stosowany do miejscowego leczenia uszkodzeń oraz zakażeń skóry.

Wskazania

Lek ten jest wskazany w miejscowym leczeniu:

- oparzeń,
- ran,
- otarć,
- owrzodzeń troficzných,
- zakażeń skóry.

Działanie

Substancją czynną leku powidon jodowany to połączenie jodu i polimeru poliwinylpyrolidonu, z którego przez pewien okres czasu po zastosowaniu leku Betadine uwalnia się jod. Wolny jod ma silne właściwości bakteriobójcze, działa też na wirusy, grzyby, a także niektóre pierwotniaki.

Dawkowanie

- Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- W leczeniu zakażeń maść nakłada się raz lub dwa razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest powidon jodowany (Povidonum Iodinatum).

Substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, makrogol 400, makrogol 4000, makrogol 1000, makrogol 1500, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Betadine:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nadczynność tarczycy i inne jawne choroby tarczycy.
- Oryszczkowe zapalenie skóry (choroba Duhringa).
- Przed i po leczeniu radioaktywnym jodem lub badaniu z użyciem jodu radioaktywnego.

Działania niepożądane

Rzadko występujące objawy niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości, kontaktowe zapalenie skóry (z takimi objawami jak zaczerwienienie, niewielkie pęcherze i świąd).

Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcja anafilaktyczna,
- obrzęk naczynioruchowy,
- nadczynność tarczycy (nadmierna aktywność tarczycy powodująca, między innymi zwiększenie apetytu, zmniejszenie masy ciała, poty, szybsze bicie serca lub niepokój ruchowy.)

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie może spowodować podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, reakcje uczuleniowe, a w rzadkich przypadkach ciężkie reakcje skórne. Jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcje uczuleniowe, należy zaprzestać stosowania leku.
- Nie należy nagrzewać leku przed nałożeniem na skórę.
- Jeśli po leczeniu wystąpią objawy wskazujące na nadczynność tarczycy, należy wykonać badania czynności tarczycy.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 24 miesiące.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Producent

DELFARMA/LAVIPHARM