

Betadine, 100 mg/ml, roztwór na skórę, 30 ml



Cena: 19,35 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	Delfarma
Opakowanie	30 ml
Postać	Roztwór
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antyseptyczne, Dezynfekujące, odkażające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Betadine to roztwór leczniczy przeznaczony do dezynfekcji skóry oraz aseptycznego zabezpieczania ran.

Wskazania

Roztwór Betadine jest stosowany do:

- Dezynfekcji skóry przed iniekcją, pobraniem krwi, biopsją igłową, transfuzją.
- Dezynfekcji skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi.
- Aseptycznego zaopatrzenia ran.
- Leczenia infekcji bakteryjnych i grzybiczych.
- Całkowitej i częściowej dezynfekcji pacjenta przed operacją (kąpiel antyseptyczna).

Działanie

Lek wykazuje silne działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, selektywnie wirusobójcze i przeciwpiętwniakowe.

Dawkowanie

Lek Betadine (100 mg/ml), stosuje się:

- w postaci nierozcieńczonej: dezynfekcja skóry przed iniekcją, pobieraniem krwi, biopsją igłową, transfuzją lub infuzją,
- w postaci 10% wodnego roztworu leku (rozcieńczenie 1:10): aseptyczne zaopatrywanie ran, dezynfekcja błon śluzowych, leczenie infekcji bakteryjnych i grzybiczych,
- w postaci 1% wodnego roztworu leku (rozcieńczenie 1:100): kąpiel pacjenta przed operacją.

Skład

Substancją czynną leku jest powidon jodowany (Polyvidonum iodatum).

Substancje pomocnicze: glicerol, nonoksynol 9, bezwodny kwas cytrynowy, disodu fosforan bezwodny, wodorotlenek sodowy, wodę

oczyszczoną.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Betadine:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nadczynność tarczycy i inne jawne choroby tarczycy.
- Orzszczkowe zapalenie skóry (choroba Duhringa).
- Niewydolność nerek.
- Przed i po leczeniu radioaktywnym jodem lub badaniu z użyciem jodu radioaktywnego

Działania niepożądane

Rzadko występujące objawy niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości, kontaktowe zapalenie skóry (z takimi objawami jak zaczerwienienie, niewielkie pęcherze i świąd).

Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcja anafilaktyczna,
- obrzęk naczynioruchowy,
- nadczynność tarczycy (nadmierna aktywność tarczycy powodująca, między innymi zwiększenie apetytu, zmniejszenie masy ciała, poty, szybsze bicie serca lub niepokój ruchowy.)

Ostrzeżenia

- Ciemnobrązowy kolor leku jest wskaźnikiem jego skuteczności. Jeśli kolor leku staje się mniej intensywny, wskazuje to na jego słabsze działanie przeciwdrobnoustrojowe. Ekspozycja na światło i temperatury powyżej 40°C przyspiesza rozkład leku. Lek ma działanie przeciwbakteryjne przy pH w zakresie 2-7.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące, przechowując w temperaturze 5°C - 15°C.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

DELFARMA/EGIS

Dostawcza 17

Łódź