

Betadine maść 0,1 g/g 30 g (tuba)

Cena: 19,78 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 g (tub.)
Postać	Maść
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Dezynfekcja, Otarcia, Owrzodzenia, Rana, Zakażenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Betadine 100 mg/g to maść lecznicza o brązowym zabarwieniu przeznaczona do aplikacji na skórę. Głównym składnikiem aktywnym jest powidon jodowany, będący połączeniem jodu z poliwinylpyrolidonem. Po nałożeniu maści Betadine uwalnia się jod, który wykazuje właściwości bakteriobójcze przez pewien czas.

Wskazania

Lek Betadine 100 mg/ g stosuje się w miejscowym leczeniu:

- oparzeń, ran, otarć, owrzodzeń troficzných, zakażeń skóry.

Działanie

Powidon jodowany jest to połączenie jodu i polimeru poliwinylpyrolidonu, z którego przez pewien okres czasu po podaniu uwalnia się jod. Wolny jod ma silne właściwości bakteriobójcze, działa na wirusy, grzyby, a także niektóre pierwotniaki. Lek Betadine jest środkiem dezynfekującym.

Dawkowanie

W leczeniu zakażeń: maść nakładać 1 lub 2 razy na dobę maksymalnie przez 14 dni.

Skład

1 g maści zawiera:

- substancja czynna: powidon jodowany 100 mg,
- substancje pomocnicze: wodorowęglan sodu, makrogol 400, makrogol 4000, makrogol 1000, makrogol 1500, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Betadine:



- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nadczynność tarczycy i inne jawne choroby tarczycy.
- Orzyczkowe zapalenie skóry (choroba Duhringa).
- Przed i po leczeniu radioaktywnym jodem lub badaniu z użyciem jodu radioaktywnego.

Działania niepożądane

- Zaczerwienienie,
- Niewielkie pęcherze,
- Świąd,

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie może spowodować podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, reakcje uczuleniowe, a w rzadkich przypadkach ciężkie reakcje skórne. Jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcje uczuleniowe, należy zaprzestać stosowania leku.
- Nie należy nagrzewać leku przed nałożeniem na skórę.
- Jeśli po leczeniu wystąpią objawy wskazujące na nadczynność tarczycy, należy wykonać badania czynności tarczycy.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 24 miesiące.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Inpharm Sp. z o.o.
ul. Genewska 6A
03-963 Warszawa