

Betadine VAG, 200 mg, globulki, 7 sztuk

Cena: 36,13 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	7 globulek
Postać	Globulki
Producent	EGIS PHARMACEUTICALS PLC
Przeznaczenie	Przeciwwgrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Betadine VAG to globulki dopochwowe zawierające jako substancję czynną jodowany powidon. Są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego i wskazane do leczenia zakażeń pochwy.

Wskazania

Lek Betadine VAG stosuje się w leczeniu zakażeń pochwy.

Działanie

Jodowany powidon jest związkiem kompleksowym jodu z powidonem (po zastosowaniu dopochwowo uwalnia jod). Jod działa na bakterie Gram-dodatnie oraz Gram-ujemne, wirusy, grzyby, a także niektóre pierwotniaki.

Dawkowanie

Zaleca się stosować 1 globulkę dopochwowo raz na dobę przez 7 dni. W razie braku poprawy należy zgłosić się do lekarza. Zaleca się zwilżenie globulki przed użyciem, a następnie wprowadzenie jej głęboko do pochwy wieczorem przed położeniem się spać.

Skład

Substancją czynną leku jest jodowany powidon (Polyvidonum iodatum).

Substancje pomocnicze: Makrogol 1000.

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu; zaburzeń czynności tarczycy; stosowania jody radioaktywnego; opryszczkowego zapalenia skóry Duhringa; u dziewcząt przed okresem pokwitania; ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

- Występujące rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): Reakcje nadwrażliwości.
- Występujące bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): Reakcja



anafilaktyczna (groźna reakcja alergiczna, powodująca trudności w oddychaniu, zawroty głowy, spadek ciśnienia tętniczego).
Obrzęk naczynioruchowy (groźna reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła).

Inne działania niepożądane występujące:

- Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): Zapalenie skóry (tzw. kontaktowe zapalenie skóry (z objawami takimi jak zaczerwienienie, małe pęcherze i swędzenie).
- Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): Nadczynność tarczycy (nadmierna aktywność gruczołu tarczycowego powodująca zwiększenie apetytu, utrata masy ciała, poty, szybsze bicie serca lub niepokój ruchowy) u pacjentek z chorobą tarczycy w wywiadzie.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Betadine VAG należy omówić z lekarzem, jeśli pacjenta ma niewydolność nerek.
- Należy unikać regularnego stosowania globulek Betadine VAG w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków zawierających sole litu.
- Długotrwałe stosowanie leków zawierających jodowany powidon może wywołać podrażnienie skóry, a w rzadkich przypadkach ciężkie reakcje skórne. Jeśli wystąpi podrażnienie lub nadwrażliwość, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Stosowanie powidonu jodowanego (Betadine VAG) może prowadzić do przejściowego przebarwienia skóry w miejscu aplikacji, co jest spowodowane własnym kolorem tego leku.
- Lek może powodować fałszywie dodatnie wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak np. wykrywanie krwi utajonej w kale lub moczu oraz wykrywanie glukozy w moczu.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po upływie 7 dni nie nastąpi poprawa lub jeśli w ciągu 6 miesięcy wystąpią więcej niż 2 zakażenia pochwy.

Producent

EGIS
17 Stycznia 45d
Warszawa