

Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek, Delfarma

Cena: 14,88 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BISACODYL
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletek
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Bisacodyl 5 mg to lek stosowany w leczeniu zaparć różnego pochodzenia. Preparat zwiększa skurcze jelit, stymulując ruchy perystaltyczne, oraz zwiększa ilość niewchłoniętej wody w jelicie grubym.

Wskazania

- Zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne).
- Opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (np. rektoskopia, cholecystografia, urografia, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa).

Działanie

Działa na jelito grube poprzez:

- nasilenie skurczu jelit i pobudzenie ruchów perystaltycznych
- zwiększenie ilości niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

- Doustnie, 5 mg do 10 mg (1 do 2 tabletek) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:

- Doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc).



Składniki

- Substancją czynną leku jest Bisakodyl.

Pozostałe składniki to:

- Rdzeń tabletki: Skrobia ziemniaczana, Laktoza jednowodna, Talk, Magnezu stearynian, Żelatyna
- Otoczka: Kwasu metakrylowego i Etylu akrylanu kopolimer (1:1), Sodu wodorotlenek, Trietylu cytrynian, Polisorbat 20, Talk, Tytanu dwutlenek (E171),

Czerwień koszenilowa (E 124) Lak, Symetykon

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Bisacodyl VP

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą chorobę jamy brzusznej wymagającą interwencji chirurga (między innymi niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego).
- Jeśli u pacjenta występuje choroba Leśniowskiego–Crohna.
- Jeśli u pacjenta występuje wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
- Jeśli u pacjenta występuje krwawienie z przewodu pokarmowego.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie odwodnienie.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- bóle brzucha i biegunka.

Producent

DELFARMA