


Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek dojelitowych

Cena: 15,13 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BISACODYL
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 4 lat

Opis produktu

Opis

Bisacodyl VP to lek w formie tabletek dojelitowych, który ma działanie przeczyszczające i wiatropędne. Jego mechanizmy działania obejmują dodatkowe aspekty:

- Nasilenie skurczu i wynikające z niego skutki perystaltyczne w jelicie grubym.
- Wzmocnione ilości niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie.

Lek działa bezpośrednio na błonę śluzową jelita grubego, a następnie rozwiązanie nerwowe w splotach jelitowych. Dzięki temu Urządzenie Bisacodyl VP pomaga rozluźnić i przesunąć masę kałową w jelicie, co ułatwia proces wypróżniania.

Wskazania

Lek Bisacodyl VP stosuje się w przypadku:

- występowania zaparć różnego pochodzenia, w tym nawykowych i przewlekłych zaparć u osób obłożnie chorych, nawykowych zaparciach u osób w podeszłym wieku, zaparciach po zmianie diety, zaparciach w okresie pooperacyjnym,
- konieczności opróżnienia jelita przed planowanymi badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi, w tym rektoskopią, cholecystyografią, urografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Działanie

Przeczyszczające, wiatropędne, ułatwiające wypróżnianie się.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: doustnie, 1-2 tabletki na noc.

- Dzieci w wieku 4-10 lat: doustnie, 1 tabletką na noc.

Skład

1 tabletką dojelitową zawiera:

- substancję czynną: bisakodyl 5mg,
- substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, żelatyna; otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, polisorbit 20, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień koszenilowa (E124) lak, symetykon.

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu oraz u dzieci poniżej 4 lat; w ostrej chorobie jamy brzusznej, wymagającej interwencji chirurga (nieδροżność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego); chorobie Leśniowskiego -Crohna; wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego; krwawieniu z przewodu pokarmowego; stwierdzonym ciężkim odwodnieniu.

Działania niepożądane

- reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktycznymi.
- bóle brzucha i biegunka.

Ostrzeżenia

- Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia oraz zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej.
- Produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej.
- Lek zawiera laktozę - w przypadku uczulenia na laktozę, przed zastosowaniem należy poinformować o tym lekarza.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.